

Endeldarmonderzoek: Sigmoidoscopie

Uw behandelend arts heeft met u afgesproken een endeldarmonderzoek (sigmoidoscopie) te verrichten. Dit onderzoek wordt door een maag-darm-leverarts of internist uitgevoerd en beoordeeld. Het onderzoek vindt plaats op de functie-afdeling maag- darm-leverziekten.

Bij een sigmoidoscopie wordt het laatste gedeelte van de dikke darm bekeken en kunnen mogelijke afwijkingen worden vastgesteld. Voor het onderzoek wordt gebruik gemaakt van een endoscoop: een flexibele slang, waarin zich een bestuurbare kijker bevindt. De arts brengt deze endoscoop in via de anus. Het onderzoek kan onplezierig zijn en duurt ongeveer 10 minuten.

Eigen medicijngebruik:

Wanneer u ijzertabletten gebuikt moet u de inname hiervan vijf dagen tevoren stoppen.

Uw afspraak

Op de functie-afdeling maag- darm- leverziekten Vleugel B, 1ste verdieping (0318) 43 41 70

Datum onderzoek:

Tijd aanwezig:.....

Tijd onderzoek:

Mocht u verhinderd zijn, dan wordt u verzocht dit zo spoedig mogelijk te melden.

De voorbereiding op de afdeling

U wordt op de functie- afdeling maag-darm-leverziekten ontvangen door een endoscopieverpleegkundige. Deze begeleidt u tijdens het onderzoek.

- Een half uur voor het onderzoek krijgt u twee klysma's om de darmen goed schoon te maken.
- Voor het onderzoek wordt u gevraagd uw onderkleding en schoenen uit te doen.
- Vervolgens wordt u gevraagd op uw linkerszij op de onderzoekstafel te gaan liggen (met uw knieën opgetrokken).



Het onderzoek

Het onderzoek wordt uitgevoerd door een specialist (deze is niet altijd uw behandelend arts). Omdat het inbrengen van de endoscoop af en toe pijnlijk kan zijn, worden de endoscoop en de anus ingesmeerd met een glijmiddel. De endoscoop wordt vervolgens via de anus in de darm gebracht. Tijdens het inbrengen wordt via de scoop lucht in uw darm geblazen. Zo kan het slijmvlies beter worden geïnspecteerd. Het inblazen van lucht kan soms pijn veroorzaken.

Het is mogelijk dat de arts besluit om tijdens het onderzoek stukjes slijmvlies weg te nemen voor verdere microscopisch onderzoek. Dit gebeurt via de ingebrachte scoop en is niet pijnlijk.

Mogelijke complicaties van het onderzoek

Een sigmoïdoscopie is over het algemeen een veilig onderzoek. Complicaties komen bij dit onderzoek vrijwel niet voor. In enkele zeldzame gevallen vereist een complicatie een ziekenhuisopname of zelfs een operatie. Dit is bijvoorbeeld nodig bij een darmbloeding of darmperforatie (het doorboren van de darmwand).

De uitslag

De uitslag van het onderzoek gaat naar uw behandelend arts. Deze heeft de uitslag binnen drie werkdagen. Indien er weefselonderzoek wordt gedaan, duurt dit zeven werkdagen.

Vragen

Heeft u voor of na het onderzoek vragen, dan kunt u deze altijd stellen aan de medewerkers van de afdeling maag-darm-leverziekten, *tel. (0318) 43 41 70.*

