

Dikke darmkanker

In Nederland wordt jaarlijks bij ongeveer 10.000 mensen dikke darmkanker vastgesteld. Het merendeel van de tumoren ontstaat in de laatste delen van de dikke darm: het sigmoïd en de endeldarm. Wanneer een dikke darmtumor groter wordt, groeit deze door de verschillende lagen van de darmwand heen. Rondom de darmen bevindt zich een uitgebreid systeem van lymfvaten en lymfklieren. Naarmate een tumor verder in de darmwand groeit, wordt het risico groter dat er tumorcellen losraken. Via het lymfvocht kunnen ze in de lymfklieren terechtkomen en daar uitzaaiingen vormen.

Cellen van een dikke darmtumor kunnen zich ook via het bloed verspreiden. Zo kunnen elders in het lichaam uitzaaiingen ontstaan, bijvoorbeeld in de lever, longen of botten.

Daarnaast kunnen losgeraakte cellen van een dikke darmtumor in de buikholte terechtkomen en zich daar nestelen.

Wanneer een tumor zich in de dikke darm bevindt, kunnen verschillende klachten klachten veroorzaken:

- Veranderingen in het ontlastingspatroon, bijvoorbeeld verstopping of afwisselendverstopping en diarree.
- Bloed en/of slijm bij de ontlasting
- Loze aandrang.

Wanneer de tumor zich in het begin van de dikke darm bevindt, treden klachten vaak later op dan bij een tumor in het laatste gedeelte van de dikke darm. Omdat de ontlasting daar nog dun is, kan het de tumor gemakkelijk passeren. De eerste klachten zijn vaak:

- Vermoeidheid en duizeligheid door ongemerkt bloedverlies.
- Vage buikpijn.
- Een gevoelige/ pijnlijke plek in de rechter onderbuik.

