



Nortriptyline

voor de behandeling van buikpijn

De MDL-afdeling zoekt:
Mensen met een overgevoelige maag

Doel van het onderzoek:

Te onderzoeken hoe werkzaam nortriptyline is voor de behandeling van functionele dyspepsie, oftewel een overgevoelige maag.

Wie kan er deelnemen?

U kunt deelnemen als u tenminste:

- Tussen de 18-65 jaar bent
- Geen antidepressiva gebruikt
- Geen grote buikoperaties heeft gehad
- Geen epilepsie heeft
- Geen glaucoom heeft
- Niet zwanger bent
- Regelmatig pijn of een brandend gevoel heeft in de maagstreek heeft, EN/OF:
- Regelmatig een vol of opgeblazen gevoel heeft of snel verzadigd bent na de maaltijd

Wat houdt deelname in?

- Na een medische screening, genetische test en het invullen van een klachten dagboek (2 weken) wordt bepaald of u kunt deelnemen
- **Behandeling van 12 weken** met één van onderstaande middelen:
 - Nortriptyline capsules
 - Placebo (nepmiddel)
- Het invullen van een dagboek en vragenlijsten tijdens behandeling
- Minimaal 3 korte ziekenhuis bezoeken

Vergoeding:

Bij volledige deelname:

150 EURO + reiskosten

Deelname

Als u belangstelling heeft om aan dit onderzoek deel te nemen, kunt u voor meer informatie contact opnemen met:

- De research verpleegkundigen van Ziekenhuis Gelderse Vallei
Email: researchverpleegkundigen@zgv.nl | Telefoon: 0318 43 5499
- Drs. A.B. Beckers, arts-onderzoeker Maag-Darm-Leverziekten MUMC+
Email: tender-intmed@maastrichtuniversity.nl | Telefoon: 043 388 1844