

Ptosis

Uw plastisch chirurg heeft bij u een hangend ooglid geconstateerd. Dit heet ook wel een ptosis. In deze folder kunt u lezen wat een ptosis is en wat de behandeling inhoudt.

Wat is een ptosis?

Bij een ptosis zien we een hangend ooglid. Dit wordt veroorzaakt doordat de aanhechting van de spier, die het ooglid optilt aan de ooglidrand, beschadigd is. Of doordat het peesblad van de spier is uitgerekt of veranderd. Een operatie kan deze problemen verhelpen.

Vóór de operatie

Overleg over uw medicijngebruik

Gebruikt u medicijnen? Vertel dan vóór de operatie aan uw plastisch chirurg welke medicijnen u gebruikt. Gebruikt u bloedverdünnende middelen, zoals Ascal/ acetylsalicylzuur of Plavix? Dan kan het zijn dat u hiermee tijdelijk moet stoppen in de 7 dagen vóór de operatie. Zo voorkomt u een bloeding of bloeduitstorting. Overleg hierover eerst met de arts die deze medicijnen heeft voorgeschreven. Hij of zij bespreekt met u of u (tijdelijk) met deze medicijnen moet stoppen.

Als u bij de trombosedienst komt

Komt u bij de trombosedienst voor de dosering van uw bloedverdünners, zoals acenocoumarol of marcoumar? Neem dan vóór de operatie contact op met de trombosedienst. Zij geven u een recept voor vitamine K. Dit moet u 30 uur voor de operatie innemen.

Verwijder sieraden en make-up

U mag geen sieraden dragen aan de hand waaraan u geopereerd wordt. Ook nagellak en kunstnagels zijn niet toegestaan.

Stop (tijdelijk) met roken

Rookt u? Dan is het verstandig om hiermee (tijdelijk) te stoppen. Mensen die roken, lopen meer kans op complicaties na de operatie. Probeer daarom te stoppen met roken vanaf enkele weken voor de operatie tot (in ieder geval) 3 weken na de operatie.

De operatie

De operatie vindt plaats onder plaatselijke verdoving. U krijgt de verdoving via een injectie (spuitje). Tijdens de operatie wordt de aanhechting van de spier hersteld of wordt de uitgerekte spier ingekort.

Na de operatie

Koel het oog

Na de operatie kan het prettig zijn om het oog te koelen. Dit kan bijvoorbeeld met diepvriesdoperwten in een plastic zakje. Leg deze niet direct op het oog, maar doe er een zachte tissue of zakdoek tussen. Koel het oog hiermee 15 minuten lang. Herhaal dit elk uur in de 2 dagen na de operatie.

Doe rustig aan

In de week na de operatie moet u rustig aan doen. Zo voorkomt u dat er druk op de wond komt. Wees voorzichtig met hoesten, niezen en persen. U mag niet bukken en geen zware dingen tillen.

Laat hechtingen verwijderen

5 tot 7 dagen na de operatie komt u terug om de hechtingen te laten verwijderen.

Gevolgen en risico's

Zoals bij iedere operatie bestaat ook bij deze ingreep een klein risico op complicaties. Zoals asymmetrie, een nabloeding, bloeduitstorting, wondinfectie of verdere problemen met de wondgenezing.

Bij pijn, zwelling of koorts

Krijgt u binnen 24 uur na de ingreep last van abnormale pijn, ernstige zwelling of koorts? Bel dan de spoedeisende hulp: (0318) 43 43 43. Krijgt u na 24 uur last van deze klachten? Neem dan contact op met de polikliniek plastische chirurgie: (0318) 43 52 70. Buiten kantoortijden kunt u de huisartsenpost bellen: (0318) 200 800.

Vragen?

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan gerust contact op met de polikliniek plastische chirurgie. U kunt ons bereiken op werkdagen tussen 08.30 -17.00 uur via het telefoonnummer (0318) 43 52 70.

Waar en wanneer wordt u geopereerd?

De behandeling vindt plaats bij Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede (kort verblijf); u ontvangt hiervoor schriftelijk een afspraak. Het kan voorkomen dat de arts die u tijdens het spreekuur op de polikliniek heeft gezien, niet de arts is die de operatie uitvoert.