

Wortelblokkade cervicaal

In overleg met uw arts heeft u besloten dat u, in verband met uw pijnklachten, een wortelblokkade zult ondergaan.

Een wortelblokkade is een behandeling waar medicatie (corticosteroiden) om een bepaalde zenuwwortel wordt gebracht.

Algemene informatie

Dit is een poliklinische behandeling, tenzij de arts anders met u afgesproken heeft. De assistente van het Pijncentrum haalt u op uit de wachtkamer en neemt u mee naar de behandelkamer waar u de behandeling krijgt. Na de behandeling verblijft u nog 15-30 minuten bij de verpleegkundige op de herstelkamer van ons behandelcentrum.

Behandeling

Deze behandeling vindt plaats ter hoogte van de nek. U neemt plaats op uw rug op de behandeltafel. Door middel van een naald, die onder röntgendoorlichting bij de zenuwwortel wordt geplaatst, worden medicijnen ingespoten. Hierdoor nemen de zwelling en ontsteking van het zenuwweefsel af, waardoor pijnvermindering optreedt. De behandeling duurt ongeveer 10 tot 15 minuten.

Complicaties

Complicaties zijn zeldzaam en de arts voert de behandeling altijd zorgvuldig uit. Toch bestaat er een kleine kans op complicaties zoals:

- een langer durende gevoelsvermindering in het huidgebied van de behandelde zenuwstructuur. Dit verdwijnt meestal na een aantal maanden
- een lokale infectie
- een lokale bloeding
- een allergische reactie

Bijwerkingen

- De verdovingsvloeistof die gebruikt wordt kan een kortdurende krachtsvermindering veroorzaken.
- U kunt na de behandeling last krijgen van napijn. Deze napijn kan enkele dagen aanhouden, maar verdwijnt altijd weer. Indien u hier veel hinder van ondervindt, kunt u hiervoor een pijnstiller innemen, bijvoorbeeld Paracetamol.
- Vrouwen kunnen door de gebruikte medicatie tijdens de behandeling last krijgen van opvliegers en een verstoorde menstruatie (gedurende één cyclus).
- Diabetespatiënten kunnen soms merken dat hun bloed suikers een aantal dagen verhoogd zijn.

Resultaat

Pas na 2 tot 3 weken kan er pijnvermindering optreden. In een aantal gevallen is een herhaling of een aanvullende behandeling noodzakelijk.

Attentie

- Informeer uw arts over een eventuele allergie voor jodium, contrastmiddel of medicijnen.
- Informeer uw arts over een eventuele zwangerschap in verband met de röntgenstraling die tijdens de behandeling gebruikt wordt.
- De anticonceptiepil is tot de eerstvolgende menstruatie niet meer betrouwbaar.
- Als u antistollingsmiddelen / bloedverduuners gebruikt waarvoor controle bij de trombosedienst nodig is (Acenocoumarol/Sintrom of Fenprocoumon/Marcoumar), bespreek dit dan met uw arts. Over het algemeen mag u deze medicijnen door blijven gebruiken en krijgt u een recept voor vitamine K tablet/drank mee naar huis. Neem deze tablet/drank 36 - 48 uur voor de behandeling in. Het is belangrijk dat u op de dag van de behandeling eerst bloed laat prikken bij het laboratorium van Ziekenhuis Gelderse Vallei.
- Gebruikt u antistollingsmiddelen / bloedverduuners waarvoor geen controle nodig is bij de trombosedienst, bespreek dan met uw arts of u met deze medicijnen moet stoppen of kunt doorgaan.
- Na de behandeling mag u dezelfde dag niet zelfstandig aan het verkeer deelnemen omdat u last kunt hebben van een kortdurende krachtsvermindering van de armen.

Indien u op de dag van de behandeling koorts heeft, verzoeken wij u om telefonisch contact op te nemen met uw behandelend arts.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Stel deze gerust aan de assistente van het Pijncentrum. Neem tussen 08.30 - 16.30 uur contact op met Pijncentrum Gelderse Vallei (0318) 43 43 45.

Zijn er binnen 24 uur na de behandeling problemen en valt dit buiten kantoor tijden? Neem dan contact op met de afdeling spoedeisende hulp (0318) 43 58 05.