

**Ilomedine**  
Iloprost®

**Het doel van deze folder is u praktische informatie te geven over het nieuwe medicijn dat u gaat gebruiken: ilomedine**

### **Hoe werkt ilomedine?**

Ilomedine is een prostacycline-analoon waarvan het werkingsmechanisme nog niet volledig bekend is. Ilomedine werkt vaatverwijdend en remt het vastplakken van de bloedplaatjes aan de vaatwand. Hierdoor zorgt het voor een betere bloeddorstrooming.

Een deel van de patiënten bemerkt direct effect: de aangedane plekken worden warmer en kunnen rood verkleuren. Soms treedt het effect geleidelijk op in de loop van een aantal weken.

Een klein deel van de behandelde patiënten bemerkt geen effect van ilomedine.

### **Voor welke aandoening wordt ilomedine gebruikt?**

Ilomedine infusen wordt voorgeschreven bij een ernstig fenomeen van Raynaud en bij patiënten met niet of slecht genezende wondjes vaak aan handen/voeten in het kader van onder andere reumatische auto-immuunziekten zoals systemische sclerose en systemische lupus erythemadodes (SLE).

### **Hoe wordt ilomedine gebruikt?**

Ilomedine wordt toegediend in de vorm van een infuus. Een infuus kuur duurt meestal vijf dagen, waarin u gedurende zes uur per dag ilomedine krijgt toegediend. De dosering van ilomedine wordt langzaam opgehoogd en bij elke verhoging wordt uw bloeddruk en polsslag gecontroleerd. De dosering is afhankelijk van hoe u het medicijn verdraagt.

### **Hoe moet het bewaard worden?**

Ilomedine wordt altijd toegediend in het ziekenhuis.

### **Wat zijn mogelijke bijwerkingen?**

In de bijsluiting van het medicijn vindt u een uitgebreid overzicht van alle bijwerkingen die kunnen voorkomen. Hieronder vindt u belangrijke bijwerkingen om van op de hoogte te zijn:

- de bijwerkingen van ilomedine treden op tijdens het infuus zelf en zijn over het algemeen daarna verdwenen
- tijdens het infuus gevoel van opvliegers met warmtesensatie en blozen, transpireren, hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid en braken. Indien deze bijwerkingen optreden wordt de dosering van ilomedine (infuussnelheid) aangepast

- tijdens het infuus kan optreden een sterke daling van de bloeddruk, trage polsslag, pijn op de borst. Indien deze bijwerkingen optreden wordt het infuus tijdelijk of definitief gestaakt
- maag- en darmklachten zoals mindere eetlust, maagzuur en diarree
- tijdens het infuus kan een overgevoeligheidsreactie optreden. Als u last krijgt van kortademigheid, ernstige duizeligheid, licht gevoel in het hoofd, koude rillingen, zwelling van de lippen, huiduitslag of jeuk, moet u dit onmiddellijk laten weten aan de verpleegkundige, zodat hij/zij meteen de arts kan waarschuwen. Zo nodig wordt de toediening van ilomedine vertraagd of onderbroken of een anti-allergie middel toegediend
- allergieën en overgevoeligheidsreacties kunnen voorkomen zowel bij de tabletten als het infuus. Bij nieuwe huidafwijkingen, koorts of benauwdheidsklachten adviseren we u zo spoedig mogelijk contact op te nemen met uw huisarts en/of behandelaar

## **Zijn er controles noodzakelijk tijdens het gebruik van ilomedine?**

Tijdens toediening wordt regelmatig de bloeddruk gecontroleerd. Er zijn geen extra bloedcontroles nodig voor of na het toedienen van ilomedine.

## **Kan het gebruikt worden met andere medicijnen?**

De bloeddrukverlagende werking van antihypertensiva (bloeddrukverlagende middelen) kan worden versterkt. Door het effect van ilomedine op de bloedplaatjes is voorzichtigheid geboden gebruik van bloedverdunners.

## **Wat moet u nog meer weten?**

### *Alcohol*

Door het gebruik van alcohol kunt u meer last van bijwerkingen krijgen. Daarom wordt het gebruik van alcohol op de dagen dat u behandeld wordt met ilomedine ontraden.

### *Autorijden*

Ilomedine kan de bloeddruk verlagen en hierbij klachten van hoofdpijn en duizeligheid geven. Autorijden direct na behandeling wordt ontraden.

### *Operaties en tandheelkundige ingrepen*

Wij adviseren om uw (tand)arts te melden dat u ilomedine gebruikt zodat deze zo nodig maatregelen kan nemen.

### *Reizen*

Overleg met uw behandelaar of en hoe u mag reizen. Denk eraan om tijdig een medicatie paspoort bij uw apotheek aan te vragen dat u meeneemt op

reis.

### *Vaccinaties*

Bij een reumatische ziekte adviseren wij om u jaarlijks tegen de griep (influenza) te laten vaccineren door uw huisarts. Heeft u een vaccinatie nodig, overleg dan altijd van tevoren met uw reumatoloog of huisarts.

### *Vruchtbaarheid, zwanger worden en borstvoeding*

Van ilomedine is niet bekend of het de vruchtbaarheid beïnvloedt. Er is weinig informatie over de effecten van ilomedine tijdens zwangerschap. Ilomedine mag daarom niet tijdens de zwangerschap worden gebruikt.

Indien u plannen heeft om in de nabije toekomst zwanger te worden of onverwacht zwanger bent adviseren wij u dit kenbaar maken aan uw behandelaar.

Het is niet bekend of dit geneesmiddel in de moedermelk overgaat. U mag daarom geen borstvoeding geven als u ilomedine gebruikt.

Ilomedine mag niet worden toegediend als u een aandoening hebt met een groot risico op bloedingen zoals een maagzweer of een recente bloeding in het hoofd. Behandeling wordt afgeraden bij recente hartaandoeningen, zoals een hartinfarct of hartfalen.

## **Vragen**

Wanneer u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft, zal uw behandelend reumatoloog deze graag beantwoorden.

Polikliniek reumatologie:  
mevrouw A. Bakker  
mevrouw dr. E.A.J. Dutmer  
dr. M.J. Rood  
dr. J.N. Stolk

Telefoonnummer (0318) 43 43 45