



Medicijnen bij jicht

Jicht wordt in principe behandeld met medicijnen. Deze worden in 2 categorieën onderverdeeld:

- Ontstekingsremmers
- Urinezuurverlagende medicijnen

Ontstekingsremmers

Hiermee wordt de aanval tot rust gebracht. Ontstekingsremmers hoeft u vaak maar kortdurend in te nemen, alleen tijdens of tot kort na een jichtaanval.

Indicatie

Een acute jichtaanval, indien NSAID's niet wenselijk zijn of niet goed worden verdragen en ter preventie van een jichtaanval bij het begin van een urinezuurverlagende therapie.

Voorschrift

- Colchicine.
- Prednison en prednisolon.

Colchicine

Innameadvies

Tabletten innemen met een ruime hoeveelheid water.

Het is belangrijk géén grapefruit(sap) en hieraan verwante fruitsoorten (zoals pomelo, tangelo, mineola, orlando, sweetie en bittersinaasappel (ook pomerans of zure oranje genoemd) en ugli) te gebruiken.

Bijwerkingen

Zelden maagdarmklachten (misselijkheid, braken, buikpijn en diarree).



Allopurinol (Zyloric®)

Innameadvies

De tabletten innemen na de maaltijd.

Bijwerkingen

- Zelden in het begin een jichtaanval en huiduitslag.

Febuxostat (Adenuric®)

Innameadvies

De tabletten kunnen met of zonder voedsel kan worden ingenomen.

Bijwerkingen

- Zelden in het begin een jichtaanval, huiduitslag, hoofdpijn en vocht vasthouden. Maagdarmklachten (misselijkheid (te voorkomen door innamen na de maaltijd) en diarree)
- Zeer zelden verminderde eetlust, braken, buikpijn, winderigheid en verstopping.

Benzbromaron (Desuric®)

Innameadvies

Tablet innemen bij het ontbijt, heel doorslikken.

Bijwerkingen

- Zelden in het begin een jichtaanval, diarree.

Bij ernstige nierschade wordt gebruik afgeraden.



Let op:



- Vaak wordt bij een acute jichtaanval een NSAID als ontstekingsremmer voor-geschreven. Bij chronische nierschade is dit niet wenselijk omdat deze ervoor kan zorgen dat de nierfunctie verder achteruit gaat.
- Als u begint met urinezuurverlagende therapie kan een jichtaanval tijdelijk verergeren of er kan een nieuwe aanval ontstaan. Daarom worden deze middelen in principe pas gestart nadat de acute aanval voorbij is en krijgt u de eerste weken (soms langer) ook colchicine.
- Febuxostat (Adenuric®) wordt alleen onder voorwaarde vergoed.