

Bloodpatch

In overleg met uw arts is besloten dat u, in verband met uw hoofdpijnklachten, in aanmerking komt voor een epidurale bloodpatch. Uw hoofdpijnklachten zijn ontstaan ten gevolge van een bekende complicatie van een eerder uitgevoerde behandeling (een epidurale injectie of door spinale anesthesie), waarbij het hersenvlies is aangeprikt. Door dit gaatje blijft bij u langer dan gewoonlijk hersenvocht weglekken. Het doel van deze ingreep is om dit gaatje te dichteren met uw eigen bloed. Er komt een bloedstolsel (een korstje) te zitten, waardoor de lekkage stopt en uw hoofdpijnklachten verdwijnen. Op termijn groeit het gaatje dicht en lost het stolsel op.

Algemene informatie

U wordt voor deze behandeling tijdelijk opgenomen op een verpleegafdeling in Ziekenhuis Gelderse Vallei. Voor uw behandeling wordt u vanaf de verpleegafdeling naar de herstelkamer van behandelcentrum B1 gebracht. Daar wordt u opgehaald door de assistentes van het Pijncentrum. Zij nemen u mee naar de behandelkamer waar u de behandeling krijgt.

Na de behandeling gaat u naar de verpleegkundige op de herstelkamer. Hier verblijft u totdat u weer terug mag naar de verpleegafdeling. Het is belangrijk dat u na de behandeling een aantal uren platte bedrust houdt, minimaal 6 uur. Dit in overleg met uw behandelend arts. Verder is het aan te raden om na de behandeling veel te drinken, 1,5 tot 2 liter vocht.

Behandeling

U neemt plaats in buikligging op de behandeltafel, er ligt een kussen onder uw buik. De arts brengt in uw hand/arm een infuusnaald in. Hieraan wordt een infuusslangetje bevestigd. Na een verdovingsprik, in uw rug, plaats de arts de epidurale naald ter hoogte van de lekkage. Hierna trekt de arts via het infuusslangetje, in uw hand/arm, wat bloed op en brengt dit in via de epidurale naald in uw rug. Tenslotte wordt de epidurale naald verwijderd en mag u in rugligging plaatsnemen in bed. De behandeling duurt ongeveer 15 minuten.

Na de behandeling

- De eerste 12 uur na de behandeling kunt u niet deelnemen aan het verkeer.
- Doet er zich thuis een probleem voor waarvan u denkt dat deze te maken heeft met de behandeling die u heeft ondergaan, dan kunt u:
 - op werkdagen tussen 08.30-16.30 uur contact opnemen met de polikliniek assistent van het Pijncentrum, (0318) 43 58 70
 - buiten kantoortijden, binnen 24 uur na behandeling, contact opnemen met de spoedeisende hulp, (0318) 43 58 05
 - na 24 uur, buiten kantoortijden, contact opnemen met de Huisartsenpost, (0318) 20 08 00

Complicaties

Complicaties zijn zeldzaam en de arts voert de behandeling altijd zorgvuldig uit. Toch bestaat er een kleine kans op complicaties, zoals:

- een lokale infectie
- een lokale bloeding
- een allergische reactie

Bijwerkingen

- U kunt na de behandeling last krijgen van napijn. Deze napijn kan enkele dagen aanhouden, maar verdwijnt altijd weer. Als u hier veel last van heeft, kunt u hiervoor een pijnstillert innemen, bijvoorbeeld Paracetamol.

Resultaat

U merkt snel na de behandeling dat uw hoofdpijnklachten geleidelijk aan afnemen. Soms is het nodig om de behandeling te herhalen.

Attentie

- Informeer uw arts over een eventuele allergie voor jodium, contrastmiddel of medicijnen.
- Informeer uw arts over een eventuele zwangerschap in verband met de röntgenstraling die tijdens de behandeling gebruikt wordt.
- Als u antistollingsmiddelen / bloedverdunners gebruikt waarvoor controle bij de trombosedienst nodig is (Acenocoumarol/Sintrom of Fenprocoumon/Marcoumar), bespreek dit dan met uw arts. Over het algemeen mag u deze medicijnen door blijven gebruiken en krijgt u een recept voor vitamine K tablet/drank mee naar huis. Neem deze tablet/drank 36 - 48 uur voor de behandeling in. Het is belangrijk dat u op de dag van de behandeling eerst bloed laat prikken bij het laboratorium van Ziekenhuis Gelderse Vallei.
- Gebruikt u antistollingsmiddelen / bloedverdunners waarvoor geen controle nodig is bij de trombosedienst, bespreek dan met uw arts of u met deze medicijnen moet stoppen of kunt doorgaan.
- Na de behandeling mag u dezelfde dag niet zelfstandig aan het verkeer deelnemen.

Indien u op de dag van de behandeling koorts heeft, verzoeken wij u om telefonisch contact op te nemen met uw behandelend arts.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Stel deze gerust aan de assistente van het Pijncentrum. Neem tussen 08.30 - 16.30 uur contact op met Pijncentrum Gelderse Vallei (0318) 43 58 70.