

Bloodpatch

In overleg met uw arts is besloten dat u, in verband met uw hoofdpijnklachten, in aanmerking komt voor een epidurale blood patch. Uw hoofdpijnklachten zijn ontstaan ten gevolge van een bekende complicatie van een eerder uitgevoerde behandeling (een epidurale injectie of door spinale anesthesie), waarbij het hersenvlies is aangeprikt. Door dit gaatje blijft bij u langer dan gewoonlijk hersenvocht weglekken. Het doel van deze ingreep is om dit gaatje te dichteren met uw eigen bloed. Er komt een bloedstolsel (een korstje) te zitten, waardoor de lekkage stopt en uw hoofdpijnklachten verdwijnen. Op termijn groeit het gaatje dicht en lost het stolsel op.

Algemene informatie

U mag voor deze behandeling gewoon alles eten en drinken, tenzij de arts anders met u afgesproken heeft.

Indien u van huis komt meldt u zich op het afgesproken tijdstip bij de receptie van vleugel B, 1^e verdieping, bestemming 111. Indien u opgenomen ligt wordt u gebracht naar de herstelkamer van ons behandelcentrum. Na de behandeling gaat u naar de verpleegkundige op de herstelkamer. Hier verblijft u totdat u naar huis terug mag of indien u al opgenomen ligt, weer terug mag naar de verpleegafdeling.

Het is belangrijk dat u na de behandeling een aantal uren platte bedrust houdt, minimaal 2 uur. Dit in overleg met uw behandelend arts. Verder is het aan te raden om na de behandeling veel te drinken, 1,5 tot 2 liter vocht.

Behandeling

U ligt op uw buik op de behandelafel en heeft een kussen onder uw buik. De arts brengt een infuusnaald in, in uw hand. Hieraan wordt een infuusslangetje bevestigd. Na een verdovingsprikje in uw rug, plaats de arts de epidurale naald ter hoogte van de lekkage. Hierna trekt de arts via het infuusslangetje in uw hand wat bloed op en brengt dit in via de epidurale naald in uw rug. Tenslotte worden de naalden verwijderd en mag u in rugligging plaatsnemen in bed. De behandeling duurt ongeveer 15 minuten.

Complicaties

Complicaties zijn zeldzaam en de arts voert de behandeling altijd zorgvuldig uit. Toch bestaat er een kleine kans op een complicatie:

- een lokale infectie
- een lokale bloeding
- een allergische reactie

Bijwerkingen

- U kunt last krijgen van napijn na de behandeling. Deze napijn kan enkele dagen aanhouden, maar verdwijnt altijd weer. Indien u hier veel hinder van ondervindt, kunt u hiervoor een pijnstiller innemen, bijvoorbeeld Paracetamol.
- U kunt gedurende enkele uren last krijgen van ongecontroleerd urineverlies. Het is daarom van belang dat u voor de behandeling goed uitgeplast hebt.

Resultaat

U merkt snel na de behandeling dat uw hoofdpijnklachten geleidelijk aan afnemen. Soms is het nodig om de behandeling te herhalen.

Attentie

- Informeer uw arts over een eventuele allergie voor jodium, contrastmiddel of medicijnen.
- Informeer uw arts over een eventuele zwangerschap in verband met de röntgenstraling die tijdens de behandeling gebruikt wordt.
- Indien u antistollingsmiddelen gebruikt (Acenocoumarol /Sintrom of Fenprocoumon/Marcoumar), waarvoor controle bij de trombosedienst noodzakelijk is, dan dient u dit met uw arts te bespreken. Over het algemeen mag u deze door blijven gebruiken en krijgt u een recept voor een vitamine K tablet/drank. Die moet u 36 uur van tevoren innemen. Tevens is het belangrijk dat op de dag van de behandeling uw bloed op het laboratorium gecontroleerd wordt.
- Gebruikt u antistollingsmiddelen waarvoor geen controle nodig is bij de trombosedienst (Ascal, Acetylsalicylzuur of Plavix), bespreek dan met uw arts of u hiermee moet stoppen of kunt doorgaan.
- Na de behandeling mag u dezelfde dag niet zelfstandig aan het verkeer deelnemen.

Indien u op de dag van de behandeling koorts heeft, verzoeken wij u om telefonisch contact op te nemen met uw behandelend arts.

Vragen

Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met het Pijncentrum Gelderse Vallei tijdens kantooruren, (0318) 43 58 70.