

Sintrommitis

In deze folder wordt informatie gegeven over het door u gebruikte medicijn sintrommitis. U kunt deze folder gedurende de opname rustig doorlezen. De eerste keer dat de trombosedienst bij u langskomt krijgt u nog extra informatie.

Sintrommitis wordt gebruikt bij het voorkomen en het behandelen van bloedstolsels die gevormd kunnen worden bij allerlei aandoeningen, zoals bijvoorbeeld na een hartinfarct of na bepaalde operaties. Sintrommitis zorgt ervoor dat het bloed minder makkelijk stolt.

Dosering

De dosering van sintrommitis wordt bepaald door de trombosedienst die het bloed onderzoekt. Meestal zijn tussen de 1-8 tabletten per dag nodig. Dit kan dus elke keer anders zijn, afhankelijk van hoe snel het bloed stolt. In het ziekenhuis wordt de dosering door de arts vastgesteld.

Bijwerkingen

De meest voorkomende bijwerking van sintrommitis is het optreden van bloedingen, meestal in de vorm van blauwe plekken, neusbloedingen of wondjes die lang doorbloeden. Soms treden er allergische reacties of maagdarfstoornissen op.

Werking

Na het starten van sintrommitis is de werking pas na enkele dagen optimaal (circa 2-3 dagen). Na het stoppen van sintrommitis houdt de werking nog enkele dagen aan.

Medicijninname

De tabletten kunnen met water of een andere vloeistof worden ingenomen. Eventueel kan de tablet worden gemalen of stukgebeten.

Combinatie met andere geneesmiddelen

Het middel kan goed worden gecombineerd met de meeste geneesmiddelen. Daarnaast zijn er middelen die bij voorkeur niet met sintrommitis worden gegeven. Uw arts en apotheker letten hierop.

Zwangerschap

Sintrommitis mag de eerste drie maanden van de zwangerschap en na de 36e week van de zwangerschap niet worden gegeven. Het geven van borstvoeding kan zonder problemen plaatsvinden.

Begeleiding door trombosedienst

Iedere patiënt reageert anders op een behandeling met sintrommitis.

Daarom is voor iedereen regelmatige controle noodzakelijk. In Nederland kennen we het unieke systeem van de trombosedienst.

De dosering wordt per patiënt aangepast en door regelmatige controle wordt nagegaan of met de dosering inderdaad het gewenste stollingsniveau wordt vastgehouden.

Bij de controle zal de verpleegkundige van de trombosedienst ook altijd vragen of er zich iets bijzonders heeft voorgedaan.

Bijvoorbeeld heeft een wondje lang gebloed, waren er veel blauwe plekken of bent u vergeten de tabletten in te nemen.

U hoeft zich geen zorgen te maken over veranderingen van de dosis en ook niet over de grootte ervan. U heeft niet 'erger trombose' als u meer tabletten moet innemen dan u aanvankelijk deed. Bij het vaststellen van het aantal tabletten gaat het er om een bepaalde vertraagde stolling te bereiken en te handhaven, niet meer dan dat.

Vakantie in het buitenland

Indien u naar het buitenland op vakantie wilt doet u er goed aan om eerst de behandelend arts te raadplegen.

Kan het wel? Zijn er geen problemen vanwege hoogteverschillen, voeding of temperatuur? Hoe is de gezondheidszorg en kunnen we op tijd hulp krijgen? Soms kunt u tijdelijk stoppen met de sintrommitis of is er een verantwoorde controle mogelijk in het land waar u heen wilt.

De trombosedienst beschikt over een lijst van instellingen in het buitenland die geschikt zijn. Soms zal het verstandig zijn de vakantie uit te stellen of er van af te zien. In ieder geval moet de trombosedienst tijdig op de hoogte zijn. Ze kunnen dan rekening houden met de dosering in verband met veranderde omstandigheden en een brief maken in de taal van het land waar u heengaat. U moet ook voldoende medicijnen meenemen; deze zijn niet overal te koop of niet in de juiste hoeveelheid

Alcoholgebruik

Alcohol heeft invloed op de stolling van ons bloed. Vermijd daarom overmatig drankgebruik. Een beperkt gebruik van alcohol heeft geen bezwaar.

Vragen

Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, neemt u dan gerust contact op met de afdeling cardiologie, op werkdagen van 09.00 -16.00 uur, (0318) 43 47 12 of 43 47 13.