

Proef facetdenervatie

Indien u klachten heeft vanuit de steungewrichtjes van de wervelkolom, kunt u in bepaalde gevallen in aanmerking komen voor een RF facetdenervatie. Voorafgaand vindt er eerst een proefbehandeling plaats. Dit is een behandeling waarbij de pijngeleiding vanuit de steungewrichtjes, die gelegen zijn aan de achterkant van de wervelkolom, tijdelijk onderbroken wordt door middel van een verdovingsvloeistof.

Algemene informatie

De behandeling vindt poliklinisch plaats. De assistente van het Pijncentrum haalt u op uit de wachtkamer. Zij neemt u mee naar de behandelkamer waar u de behandeling krijgt. Na de behandeling mag u direct weer naar huis, tenzij uw behandelend arts het raadzaam vindt dat u nog even bij de verpleegkundige op de herstelkamer van ons behandelcentrum plaats neemt.

Behandeling

De behandeling kan plaatsvinden ter hoogte van de nek, de borstkas of lage rug. U neemt in de gewenste positie plaats op de behandeltafel. Als u in buikligging plaats neemt, ligt er een kussen onder uw buik. De arts plaatst onder röntgendoorlichting 3 tot 4 naalden bij de zenuwtakjes van de betreffende steungewrichten. Vervolgens volgt er door deze naalden een injectie met een verdovingsvloeistof. De verdoving die op deze manier veroorzaakt wordt, is tijdelijk en na een paar uur weer uitgewerkt.

De arts vraagt u of u wilt opletten of u tijdelijk een gunstig effect op uw klachten bemerkt in de periode tussen 30 en 90 minuten na de injectie en evalueert uw uitkomst tijdens een controlegesprek. Aan de hand van deze bevindingen wordt dan een eventuele behandeling of verder onderzoek afgesproken waarvoor u dan een andere keer terugkomt.

De behandeling duurt ongeveer 15 tot 20 minuten.

Complicaties

Complicaties zijn zeldzaam en de arts voert de behandeling altijd zorgvuldig uit. Toch bestaat er een geringe kans op complicaties, zoals:

- een lokale infectie
- een lokale bloeding
- een allergische reactie

Bijwerkingen

- Er kan een tijdelijke gevoelsvermindering optreden in de huid in de buurt van de behandelde steungewrichten.
- U kunt na de behandeling last krijgen van napijn. Deze napijn kan enkele dagen aanhouden, maar verdwijnt altijd weer. Als u hier veel last van heeft, kunt u hiervoor een pijnstiller innemen, bijvoorbeeld Paracetamol.

Attentie

- Informeer uw arts over een eventuele allergie voor jodium, contrastmiddel of medicijnen.
- Informeer uw arts over een eventuele zwangerschap in verband met de röntgenstraling die tijdens de behandeling gebruikt wordt.
- Als u antistollingsmiddelen / bloedverdunners gebruikt waarvoor controle bij de trombosedienst nodig is (Acenocoumarol/Sintrom of Fenprocoumon/Marcoumar), bespreek dit dan met uw arts. Over het algemeen mag u deze medicijnen door blijven gebruiken en krijgt u een recept voor vitamine K tablet/drank mee naar huis. Neem deze tablet/drank 36 - 48 uur voor de behandeling in. Het is belangrijk dat u op de dag van de behandeling eerst bloed laat prikken bij het laboratorium van Ziekenhuis Gelderse Vallei.
- Gebruikt u antistollingsmiddelen / bloedverdunners waarvoor geen controle nodig is bij de trombosedienst, bespreek dan met uw arts of u met deze medicijnen moet stoppen of kunt doorgaan.
- Sommige blokkades ter hoogte van de borstkas of ribben hebben een klein risico op een klaplong; indien nodig zal de anesthesioloog u hierover nader informeren.
- Na de behandeling mag u dezelfde dag niet zelfstandig aan het verkeer deelnemen omdat u last kunt krijgen van een kortdurende krachtsvermindering van de benen of armen.

Indien u op de dag van de behandeling koorts heeft, verzoeken wij u om telefonisch contact op te nemen met uw behandelend arts.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Stel deze gerust aan de assistente van het Pijncentrum. Neem tussen 08.30 - 16.30 uur contact op met Pijncentrum Gelderse Vallei (0318) 43 43 45.

Zijn er binnen 24 uur na de behandeling problemen en valt dit buiten kantooruren? Neem dan contact op met de afdeling spoedeisende hulp (0318) 43 58 05.