

# **Sulfasalazine**

Salazopyrine®

## Inhoud

Inleiding	3
Hoe werkt sulfasalazine?	3
Voor welke aandoeningen wordt sulfasalazine gebruikt?	3
Hoe moet ik het gebruiken?	3
Hoe moet ik het bewaren?	3
Wat zijn mogelijke bijwerkingen?	4
Zijn er controles noodzakelijk tijdens het gebruik?	4
Kan sulfasalazine gebruikt worden met andere medicijnen?	4
Wat moet ik nog meer weten?	4
Alcohol	4
Autorijden	4
Operaties en andere (tandheelkundige) ingrepen	4
Reizen	5
Vaccinaties	5
Vruchtbaarheid, zwanger worden en borstvoeding	5
Vragen	6

**Het doel van deze folder is u praktische informatie te geven over het nieuwe medicijn dat u gaat gebruiken: sulfasalazine.**

### **Hoe werkt sulfasalazine?**

Bij patiënten met een reumatische auto-immuunziekte is er een fout in het afweersysteem ontstaan waardoor er sprake is van een afweerreactie tegen het eigen lichaam. Dit kan in verschillende plaatsen van het lichaam gebeuren. Bij reumatische ziekten zijn dit vaak de gewrichten. Sulfasalazine is een medicijn dat deze afweerreactie onderdrukt. Het exacte werkingsmechanisme is (nog) onbekend. Gebruik van dit medicijn leidt tot een afname van pijn, zwelling en stijfheid van de gewrichten waardoor op de langere termijn de kans op gewrichtsschade afneemt. De werking van sulfasalazine treedt op na 6 tot 12 weken. Soms duurt het echter langer en bij sommige mensen werkt het medicijn helaas niet of onvoldoende.

### **Voor welke aandoeningen wordt sulfasalazine gebruikt?**

Sulfasalazine wordt gebruikt bij de behandeling van verschillende auto-immuunziekten. Het wordt onder andere gebruikt bij reumatoïde artritis en artritis psoriatica. Behalve bij reumatische aandoeningen wordt sulfasalazine ook toegepast bij chronische darmziekten zoals de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa.

### **Hoe moet ik het gebruiken?**

Sulfasalazine is verkrijgbaar in tabletten van 500 mg of in drankvorm (meestal voor kinderen). Het is gebruikelijk om te starten volgens een opbouwschema dat twee tot vier weken kan duren. De uiteindelijke streefdosis is doorgaans tweemaal per dag 1000 mg (2x per dag 2 tabletten). De maximale dosis is 6 tabletten per dag. Uw behandelaar spreekt met u af hoeveel tabletten u moet gaan gebruiken en legt u het opbouwschema uit. Om bijwerkingen zo veel mogelijk te beperken kunt u de tabletten het beste tijdens de maaltijd innemen, bij voorkeur met water. Slik elke tablet in zijn geheel door.

Als uw ziekte rustig is, kan in overleg met uw behandelaar worden besloten om de dosering te verlagen of eventueel zelfs te stoppen.

### **Hoe moet ik het bewaren?**

De sulfasalazine tabletten bewaart u in de originele verpakking bij een temperatuur lager dan 30°C.

## **Wat zijn mogelijke bijwerkingen?**

In de bijsluiter van het medicijn vindt u een uitgebreid overzicht van alle bijwerkingen die kunnen voorkomen. Hieronder vindt u belangrijke bijwerkingen om van op de hoogte te zijn:

- verminderde eetlust, misselijkheid, braken, buikpijn en diarree
- smaakstoornissen
- duizeligheid en hoofdpijn
- stemmingsstoornis
- oranje-rode verkleuring van de urine (dit kan overigens geen kwaad)
- bijwerkingen die u zelf niet merkt maar die uw behandelaar met bloedonderzoek controleert zijn leverfunctieafwijkingen en verlaagde bloedcellen
- allergieën en overgevoelighedsreacties kunnen voorkomen. Bij nieuwe huidafwijkingen, koorts, opgezette keel/tong en opgezette lymfeklieren is het van belang direct te stoppen met sulfasalazine en uw behandelaar te waarschuwen. Kreeg u ooit eerder een allergische reactie op salicylaten, zoals acetylsalicylzuur of een sulfonamide antibioticum zoals co-trimoxazol dan kunt u ook allergisch reageren op sulfasalazine. Begin dan niet direct met dit middel maar raadpleeg eerst uw arts of apotheker

## **Zijn er controles noodzakelijk tijdens het gebruik?**

Vóór en na het starten van sulfasalazine zal uw behandelaar met u laboratoriumcontroles (bloedprikken) afspreken. Dit zal in het begin regelmatig nodig zijn om in de gaten te houden hoe uw lichaam op het medicijn reageert. Bij verandering van dosering zult u mogelijk extra gecontroleerd worden.

## **Kan sulfasalazine gebruikt worden met andere medicijnen?**

Sulfasalazine kan de werking van digoxine verminderen en het kan de werking van foliumzuur beïnvloeden. Voorzichtigheid is geboden bij de combinatie met thiopurine, 6-mercaptopurine of azathioprine. Overleg met uw behandelaar bij verandering van uw medicatiegebruik.

## **Wat moet ik nog meer weten?**

### *Alcohol*

In combinatie met sulfasalazine wordt het risico op leverfunctiestoornissen verhoogd. Overleg met uw eigen behandelaar of gebruik van alcohol met mate is toegestaan.

### *Autorijden*

Er is geen bezwaar tegen autorijden tijdens het gebruik van sulfasalazine.

### *Operaties en andere (tandheelkundige) ingrepen*

Er zijn geen aanvullende maatregelen nodig bij operaties en andere (tandheelkundige) ingrepen. Informeer wel altijd uw behandelaar over uw medicatiegebruik.

### *Reizen*

Bij reizen naar het buitenland is het raadzaam een actueel overzicht van uw medicijnen mee te nemen, het medicatie paspoort. Dit is verkrijgbaar bij uw apotheek of eventueel bij uw behandelaar.

### *Vaccinaties*

Gezien het feit dat u een reumatische ziekte heeft en reuma medicijnen gebruikt, adviseren wij u om u jaarlijks tegen de griep (influenza) te laten vaccineren door uw huisarts.

Heeft u een vaccinatie nodig, overleg dan altijd van tevoren met uw reumatoloog, apotheek of huisarts.

Heeft u plannen om in de toekomst een verre reis te maken, dan raden wij u aan dit met uw behandelaar te bespreken vóór het starten van sulfasalazine. Dit vanwege een mindere effectiviteit van bepaalde vaccinaties tijdens het gebruik van sulfasalazine.

Wij raden de vaccinatie met een verzwakt levend vaccin af (bof-mazelen-rode hond (BMR), gele koorts, oraal poliovaccin of BCG) tijdens het gebruik van sulfasalazine.

### *Vruchtbaarheid, zwanger worden en borstvoeding*

Sulfasalazine heeft geen invloed op de vruchtbaarheid van vrouwen. Sulfasalazine kan bij mannen tijdelijk onvruchtbaarheid veroorzaken door een tekort aan zaadcellen. Dit verdwijnt weer na stopzetten van de medicatie (binnen twee tot drie maanden). Dus ook bij mannen met een kinderwens is het van belang hierover te overleggen met de behandelend reumatoloog. Indien u plannen heeft om in de nabije toekomst zwanger te worden of onverwacht zwanger bent adviseren wij u dit direct kenbaar te maken aan uw behandelaar. Sulfasalazine mag gebruikt worden tijdens de zwangerschap en tijdens de borstvoeding tot een dosering van 1000 mg (= 2x daags 2 tabletten).

## **Vragen**

Wanneer u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft, zal uw behandelend reumatoloog deze graag beantwoorden.

Polikliniek reumatologie:

dr. E.A.J. Dutmer

dr. M.J. Rood

dr. J.N. Stolk

dr. D.F. van Breukelen

Telefoonnummer (0318) 43 43 43 / 43 53 00