

Bijschildklierscintigrafie

Uw behandelend arts heeft voor u een onderzoek van uw bijschildklier(en) op de afdeling nucleaire geneeskunde aangevraagd. In deze folder wordt uitgelegd hoe dit onderzoek (bijschildklierscintigrafie) in zijn werk gaat en wat u kunt verwachten.

Bijschildklierscintigrafie is een onderzoek waarbij de eventueel verhoogde werking van een bijschildklier in beeld wordt gebracht. Bij dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van een kleine hoeveelheid radioactieve stof. De radioactieve stof zendt straling uit. Deze straling wordt met een zeer gevoelig apparaat, een gammacamera opgevangen. Met deze camera worden ook de foto's gemaakt. Een medisch nucleair werker voert dit onderzoek uit en vertelt u wat er gaat gebeuren.

Doel van de bijschildklierscintigrafie

Het doel van dit onderzoek is het zichtbaar maken van de verhoogde werking van de bijschildklier.

Vorbereiding

Sommige medicijnen kunnen de uitslag van het onderzoek beïnvloeden. Daarom is het soms nodig om deze medicijnen een paar dagen te stoppen. Uw specialist kan u precies vertellen hoelang u bepaalde medicijnen niet mag innemen. Neem bij onduidelijkheid contact op met de afdeling nucleaire geneeskunde.

Het onderzoek

De arts of medisch nucleair werker spuit een kleine hoeveelheid radioactieve stof in een ader in uw arm. Deze stof heeft geen bijwerkingen en is niet schadelijk. Na de injectie moet u 15 minuten wachten voor het maken van de foto's. Tijdens het onderzoek ligt u op uw rug op de onderzoektafel. Op de genoemde tijdstippen, die staan in uw afspraakbrief, worden de foto's gemaakt.

Het totale onderzoek duurt ongeveer 3 uur (inclusief wachttijd).

Nazorg

U heeft geen speciale nazorg nodig. De radioactieve stof verdwijnt vanzelf uit het lichaam binnen 1 of 2 dagen.

Uitslag

De nucleair geneeskundige beoordeelt de opnamen. Hiervan wordt een verslag gestuurd naar uw behandelend arts. Deze zal de uitslag met u bespreken op de volgende afspraak.

Belangrijk

- neemt u indien u zwanger bent, ook als u het niet helemaal zeker weet, van tevoren contact op met onze afdeling
- als u borstvoeding geeft is het belangrijk dat u contact opneemt. Er wordt dan bekeken of het nodig is gedurende enige uren met de borstvoeding te stoppen
- indien u ook bloed moet laten prikken, verzoeken wij u dit te laten doen vóór het onderzoek
- u mag niet vergezeld worden door een zwangere en/of kind jonger dan 10 jaar
- als u binnen 1 week na dit onderzoek naar het buitenland vliegt moet u dit melden
- indien u allergisch bent voor chloorhexidine dient u dit voor de injectie te melden

Vragen

Als u nog vragen heeft over het onderzoek, stelt u die dan gerust aan de medisch nucleair werker. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.00 -10.00 uur en van 13.30 -15.00 uur, (0318) 43 43 45.

U kunt zich melden aan de balie van de afdeling radiologie, de afdeling is te vinden in vleugel A, eerste etage, bestemming 41.

Indien u uw afspraak niet kunt nakomen, verzoeken wij u dit tijdig (48 uur van tevoren) door te geven. Wij kunnen dan nog een andere patiënt oproepen.