



Hepatitis B vaccinatie

Voor u als toekomstig dialysepatiënt is het belangrijk om beschermd te worden tegen infecties. Omdat er op de dialyseafdeling veel met bloed en/of bloedproducten wordt gewerkt en u mogelijk een minder goede weerstand heeft, is het belangrijk u te beschermen tegen besmettelijke aandoeningen die via het bloed worden overgedragen. Hepatitis B, een leverontsteking, is zo'n risicovolle besmettelijke aandoening, waartegen een vaccin bestaat. Alle (pre-)dialysepatiënten en ook het personeel worden preventief gevaccineerd.

Indicatie

Vaccinatie tegen hepatitis B-virus bij personen met verhoogde kans op deze infectie.

Voorschrift

Hepatitis B-vaccin (Fendrix®).

Bijwerkingen

- Soms pijn op de injectieplaats, eventueel met roodheid, zwelling, warmte of harde plek onder de huid. Deze reacties worden in het algemeen goed verdragen en verdwijnen meestal binnen twee dagen na vaccinatie. Verder vermoeidheid, hoofdpijn en prikkelbaarheid.
- Zelden maag-darmklachten (misselijkheid, braken, diarree, verminderde eetlust en buikpijn) of griepachtige klachten (hoofdpijn, koorts, spierpijn en slaperigheid).
- Zeer zelden overgevoelighedsreacties (huiduitslag, galbulten of jeuk).

Hoe wordt de vaccinatie geregeld?

- De verpleegkundige van de polikliniek nierzorg of dialyseafdeling geeft u het vaccin.
- U krijgt vier keer een injectie in de bovenarmspier verspreid over een aantal maanden: dit is in maand 0, 1, 2 en 6.



- Een maand na de vierde injectie, dus in maand 7 moet er bloed afgenomen worden voor antistoftiterbepaling. Hiermee wordt bepaald of u voldoende antistoffen heeft tegen hepatitis B.
- Als u voldoende antistoffen heeft is het klaar. Als er nog iets te weinig antistoffen zijn krijgt u hervaccinaties. De antistof-titer wordt blijvend gecontroleerd bij de bloedafnames.

Vragen en afspraken

Als u hierover nog vragen heeft of u wilt een afspraak maken voor vaccinatie, bel dan de verpleegkundige op de polikliniek nierzorg of de dialyseafdeling.