

Prostaatbiopsie

Het weghalen van stukjes weefsel uit de prostaat

De uroloog heeft besloten stukjes weefsel (biopten) van de prostaat weg te halen. Deze stukjes weefsel worden onderzocht in het laboratorium.

Vorbereiding

Bloedverduunners

Indien u bloedverduunners gebruikt:

- blijf deze gebruiken zoals u gewend bent
- stopdagen voor de biopsie met de bloedverdunner
- gebruik 2 dagen voor de biopsie om 18.00 uur een tablet vitamine K en ga door met de bloedverdunner.
Voor u betekent dit dat u op om 18.00 uur het tablet Vitamine K moet innemen

Antibiotica

U krijgt van de uroloog een recept mee voor 2 tabletten antibiotica (500 mg Ciproxin). Deze antibiotica krijgt u preventief om u te beschermen tegen infecties. Reden hiervoor is dat de stukjes weefsel via de anus en darmwand worden verwijderd en de kans op infecties hierdoor toeneemt.

- neem de eerste tablet antibiotica (500 mg Ciproxin) een half uur vóór het onderzoek in
- neem de tweede tablet antibiotica op de dag van het onderzoek om 20.00 uur 's avonds in

Pijnstilling

Om eventuele pijnklachten van de biopsie te verminderen kunt u ook *twee uur vóór het onderzoek* twee paracetamol tabletten van 500 mg innemen.

Algemeen

Wanneer u het prettig vindt dat er een bekende bij u is tijdens het onderzoek, dan is dit mogelijk.

Deelname verkeer

Van te voren dient u vervoer naar huis te regelen. Dit omdat u na de ingreep niet zelf kunt deelnemen aan het verkeer. Ook kunt u zonder begeleiding van een volwassene niet gebruik maken van openbaar vervoer of taxi.

Dag van het onderzoek

Er zijn geen andere voorbereidingen nodig dan hierboven vermeld.

U hoeft **niet nuchter** te komen! Dit betekent dat u gewoon kunt ontbijten of lunchen.

U moet er rekening mee houden dat u na het onderzoek rustig aan moet doen. Grote inspanning kan een nabloeding veroorzaken.

Na het onderzoek

U krijgt van de polikliniekassistent een verbandje in uw ondergoed om uw kleding te beschermen bij eventuele nabloeding. Het is normaal dat u bloed heeft bij de ontlasting, in het sperma en in de urine. Dit kan enkele dagen aanhouden en in het sperma enkele weken.

Als er bloed bij de urine zit moet u extra drinken totdat de urine weer helder ziet. Ook kunt u een zeurderige pijn in uw onderbuik voelen. Als u hier veel last van heeft, kunt u een tablet paracetamol of brufen innemen.

U mag één dag na het onderzoek weer starten met de bloedverdunners. Neem bij twijfel of als u toch nog veel bloed verliest contact op met de polikliniek urologie.

Mogelijke complicaties

Mogelijke complicaties kunnen zijn:

- aanhoudende bloedingen
- niet kunnen plassen
- hoge koorts (meer dan 38°C) binnen één week na de ingreep.

Neem contact op met het ziekenhuis als u een van bovengenoemde complicaties heeft.

Tijdens kantooruren kunt u bellen met de polikliniek urologie (0318) 43 43 45.

Neem buiten kantoor tijden of in het weekend contact op met de spoedeisende hulp (0318) 43 58 05.

Vragen

Als u vragen heeft over het onderzoek, stelt u ze dan gerust aan de polikliniekassistent die bij de behandeling aanwezig is.

U kunt op werkdagen tussen 08.30-12.30 en 13.30-16.30 uur bellen naar de polikliniek urologie (0318) 43 43 45.