

Provocatietest

U bent door uw dermatoloog naar ons verwezen voor het verrichten van een provocatietest. Het doel van dit onderzoek is het bevestigen dan wel uitsluiten van een allergie voor een bepaald medicijn of voedingsmiddel. Voor dit onderzoek wordt u opgenomen op de afdeling medium care. Wij gaan er van uit dat dit onderzoek een dagopname is. Maar bij het optreden van een complicatie zoals bijvoorbeeld een ernstige allergische reactie kan dit langer duren.

Voorafgaand aan de opname voor de provocatietest wordt u door een verpleegkundige gebeld om de laatste informatie door te nemen. Het is belangrijk dat u op de dag van opname nuchter bent; daarom dient u vanaf zes uur voor de opname niet meer te eten en vanaf twee uur voor de opname niet meer te drinken. Indien u toch heeft gegeten of gedronken kan het onderzoek niet doorgaan.

Wat gebeurt er tijdens de provocatietest?

Op de dag van de opname meldt u zich op de afdeling medium care, vleugel C derde verdieping. Er wordt dan een intake verricht door een arts en verpleegkundige. Vervolgens worden er twee infusen ingebracht. Afhankelijk van de ernst van de voorgaande reactie bepaalt de intensivist of er ook een infuus in een slagader moet worden ingebracht om uw bloeddruk en hartslag te kunnen controleren.

Zodra de test begint, krijgt u de medicatie toegediend. Er wordt altijd gestart met een lage dosering. Als er verder geen allergische reacties optreden, wordt dit langzamerhand verhoogd tot een volledige dagdosering. Tijdens de provocatietest mag u de afdeling niet verlaten. De eerste 24 uur na de provocatietest mag u geen overmatige lichamelijke inspanning leveren (sport).

Controle tijdens de provocatietest

Uiteraard wordt u tijdens de provocatietest nauwlettend in de gaten gehouden. Hierbij kunt u denken aan: het meten van de bloeddruk en de polsslag, meting van de maximale in- en uitademing (het flow-volume), de maximale uitademingsnelheid (de peakflow) en de lichaamstemperatuur. Bij een plotselinge forse afwijking of allergische reactie wordt altijd een arts gewaarschuwd, waarna de test eventueel (tijdelijk) gestaakt wordt. Een allergische reactie kan bestaan uit huidafwijkingen, roodheid, jeuk, zwelling van slijmvliezen, benauwdheidsklachten, lage bloeddruk en shock.

Testuitslag

De uitslag en consequenties van de provocatietest bespreekt uw dermatoloog met u.

Vragen?

Hebt u naar aanleiding van deze informatie nog vragen? Stelt u deze gerust aan de arts of verpleegkundige.

U kunt ook bellen naar de afdeling (0318) 43 41 01.