



Verdovende zalf

Verdovende zalf kan de pijn bij het aanprikken van de shunt verzachten en maakt het aanprikken makkelijker bij een stugge huid.

Indicatie

Te pijnlijk aanprikken van de shunt.

Voorschrift

De verdovende zalf is bekend onder de merknaam Emla®.

Gebruiksadvies

- U moet de Emla® zalf ongeveer een uur voordat u wordt aangeprikt op de shunt aanbrengen (bijvoorbeeld voor u in de taxi stapt).
- De verpleegkundige geeft aan op welke plaatsen van de shunt u de Emla® zalf aan moet brengen.
- Gebruik ± twee centimeter zalf per prikplaats.
- U moet de zalf aanbrengen en niet inwrijven.
- Dek daarna de hoeveelheid zalf af met pleister of huishoudfolie. Dit zorgt ervoor dat de zalf op zijn plaats blijft zitten.
- Probeer alleen de shunt te bedekken en zo min mogelijk de huid naast de shunt.

Bijwerkingen

- Zelden huidirritatie (jeuk, branderigheid, oedeem en rood- of bleekheid op de aanbrengplaats).

Bij ernstige huidirritatie moet u stoppen met de Emla® zalf omdat het dan een infectie kan veroorzaken aan de shunt. Xylocaine® spray is in dat geval een goed alternatief om te verdoven.