

Cryocoagulatie gynaecologie

Een cryocoagulatie is een behandeling om een bloedend plekje op de baarmoedermond te bevriezen of overmatige afscheiding weg te nemen. Deze behandeling heet ook wel de 'bevriesmethode'.

Nadat u op de gynaecologische stoel heeft plaats genomen, brengt de arts een speculum in. Dit is een instrument dat uw schede openhoudt. Daarna bevriest de arts het plekje in uw baarmoedermond.

Voor deze bevrozing gebruikt de arts een speciaal kegeltje waarmee de plek goed kan worden bereikt. De arts houdt het kegeltje meestal twee keer drie minuten op het plekje waardoor het bevriest. Het wondje dat daardoor ontstaat is ongeveer vier à vijf millimeter diep.

Hierdoor wordt het meest oppervlakkige laagje van de baarmoedermond/hals, dat geringe afwijkingen vertoonde, afgestoten en zal zich na verloop van enige tijd een nieuwe 'bekledingslaag' vormen.

De behandeling wordt over het algemeen niet als pijnlijk ervaren. Wel kan soms een lichte mate van buikpijn optreden. Deze buikpijn voelt vaak aan als lichte menstruatiepijn.

De behandeling duurt ongeveer 15 minuten.

U hebt voor deze ingreep geen verdoving nodig.

Na de behandeling

Na de ingreep kunt u direct weer naar huis. Het wondje is meestal binnen 6 weken genezen.

Afscheiding

Vooral de eerste dagen na de behandeling kunt u vrij veel afscheiding hebben. De afscheiding is meestal waterig met wat bloed. Dit is een normale reactie op de behandeling. Dit kan tot ongeveer 6 weken na de ingreep duren. Uw afscheiding kan soms ook onaangenaam ruiken.

Zolang u afscheiding heeft, adviseren wij u het volgende:

- u mag geen geslachtsgemeenschap hebben. Dit is om infectiegevaar te voorkomen en het wondje rustig te laten genezen
- in bad zitten en zwemmen raden wij af. Douchen kan wel
- zolang er vocht afscheiding is, gebruik maandverband, geen tampons

Verwissel het maandverband regelmatig. Als u 'de pil' gebruikt, kunt u hiermee gewoon doorgaan, ondanks het advies de eerstkomende maand geen gemeenschap te hebben. Als u een spiraaltje heeft, wordt dit tijdens de behandeling niet verwijderd.

Controle

Na ongeveer 6 weken heeft u een controlebezoek op de polikliniek. De arts bekijkt of het wondje goed genezen is.

Vragen

Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft aarzel dan niet en vraag het aan uw gynaecoloog. U kunt ook bellen met de polikliniek gynaecologie. Bellen kunt u op werkdagen tussen 08.30 uur en 17.00 uur (0318) 43 51 50