



Intradialytische parenterale voeding (IDPN)

Als u met een energie- en eiwitverrijkt dieet, aangevuld met dieetvoeding en/of sondevoeding nog niet voldoende voedingsstoffen gebruikt, komt u mogelijk in aanmerking voor IDPN.

Parenterale voeding is voeding die rechtstreeks in het bloed wordt toegediend. IDPN is een vorm van parenterale voeding, die alléén tijdens de dialyse via de dialyselijn wordt toegediend. Om te voorkomen dat de voeding direct weer wordt uitgefilterd, wordt de voeding na de kunstnier toegediend.

IDPN is in principe een tijdelijke overbrugging totdat u zelf weer voldoende kunt eten, de nPNA (de hoeveelheid eiwit per kg lichaamsgewicht) goed is en/of uw streefgewicht is bereikt.

Wat is IDPN?

IDPN is een speciale parenterale voeding die alleen eiwit, vet en koolhydraten, en dus energie levert. Er zijn geen elektrolyten, zoals natrium, kalium, calcium en fosfaat en vitamines aan toegevoegd.

Toediening

In principe wordt tijdens de dialyse 1 liter parenterale voeding gegeven. De eerste week wordt de halve hoeveelheid gegeven. Als dit goed wordt verdragen, krijgt u de tweede week de volledige hoeveelheid. De hoeveelheid vocht die onttrokken moet worden wordt verhoogd met het vocht uit de IDPN.

Controle

De eerste weken wordt er extra bloedonderzoek gedaan, om te kijken of de IDPN door uw lichaam goed wordt verdragen. De verpleegkundige controleert ook uw bloedglucosegehalte.

Bijwerkingen

Soms worden het glucosegehalte of triglyceridengehalte (een soort vet) in het bloed te hoog. Ook kunnen leverfunctiestoornissen ontstaan. Om deze bijwerkingen op te sporen is extra bloedonderzoek nodig.