

Febuxostat

Adenuric®

Het doel van deze folder is u praktische informatie te geven over het nieuwe medicijn dat u gaat gebruiken: feboxostat.

Hoe werkt Febuxostat?

Febuxostat is een medicijn dat voorgeschreven wordt aan patiënten met jicht. Jicht is een reumatische aandoening die ontstaat doordat er urinezuurkristallen in de gewrichten 'neerslaan'. Dit kan gebeuren als u te veel urinezuur in het bloed heeft. Deze 'neerslag' in de gewrichten kan leiden tot plotselinge aanvallen van gewrichtsontstekingen. Urinezuur kan ook in de huid of pezen neerslaan en zogenaamde jichtknobbels veroorzaken die we jichttophi noemen. Behandeling met feboxostat verlaagt in de loop van enkele weken tot maanden de hoeveelheid urinezuur in het bloed. Wanneer de concentratie urinezuur in het bloed laag genoeg is (meestal onder de 0,35 mmol/l), lost het urinezuur dat neergeslagen is in de gewrichten op. Nieuwe aanvallen van gewrichtsontsteking kunnen op die manier worden voorkomen. Ook kunnen de jichttophi verdwijnen. Het kan meerdere maanden duren voordat de neergeslagen urinezuurkristallen volledig opgelost zijn.

Voor welke aandoeningen wordt het gebruikt?

Febuxostat is een middel om jichtaanvallen te voorkomen en om jichttophi te laten verdwijnen. Febuxostat kan worden voorgeschreven als:

1. jichtaanvallen geregeld optreden (meer dan twee maal per jaar)
2. jichttophi aanwezig zijn
3. gewrichtsbeschadiging is opgetreden ten gevolge van jicht.

Meestal wordt Febuxostat voorgeschreven wanneer het eerste keus medicijn (allopurinol) niet kan worden voorgeschreven, bijwerkingen geeft of onvoldoende werkzaam is gebleken.

Hoe moet ik het gebruiken?

Febuxostat is verkrijgbaar in tabletten van 80 mg en 120 mg. Vaak wordt gestart met een lage dosis en wordt de dosis langzaam verhoogd tot het urinezuur in het bloed voldoende is gedaald. Uw behandelaar spreekt met u af welke dosis u gaat gebruiken. Febuxostat werkt niet tegen acute jichtaanvallen.

Een jichtaanval kan zelfs tijdelijk verergeren wanneer u begint met feboxostat tijdens een aanval.

Om aanvallen tijdens behandeling met feboxostat te voorkomen krijgt u tijdens de eerste maanden ook een medicijn voorgeschreven dat acute gewrichtsontstekingen tegengaat; meestal is dat colchicine. Stop colchicine alleen in overleg met uw behandelaar.

Hoe moet Febuxostat bewaard worden?

De febuxostat tabletten bewaart u in de originele verpakking bij een temperatuur lager dan 30°C.

Wat zijn mogelijke bijwerkingen?

In de bijsluiters van het medicijn vindt u een uitgebreid overzicht van alle bijwerkingen die kunnen voorkomen. Hieronder vindt u belangrijke bijwerkingen om van op de hoogte te zijn. Deze bijwerkingen komen bij minder dan 15% van de patiënten voor.

- hoofdpijn
- maag- en darmklachten (zoals diarree en misselijkheid)
- huiduitslag en vocht vasthouden (oedeem)
- bijwerkingen die u zelf niet merkt maar die uw reumatoloog met bloedonderzoek controleert zijn leverfunctieafwijkingen en verlaagde bloedcellen

Wanneer u overgevoelig bent voor febuxostat kan er een allergische reactie optreden. Bij nieuwe huidafwijkingen, koorts, opgezette keel/tong en opgezette lymfeklieren is het van belang direct te stoppen met febuxostat en uw behandelaar te waarschuwen. Als een dergelijke overgevoeligheidsreactie optreedt is dat meestal tijdens de eerste 6-8 weken van de behandeling.

Zijn er controles noodzakelijk tijdens het gebruik?

Het urinezuur zal worden gecontroleerd in het bloed om te meten of febuxostat voldoende werkzaam is en het urinezuur voldoende omlaag is gedaald. Tijdens de behandeling met febuxostat is het belangrijk dat het bloed wordt gecontroleerd op bijwerkingen. Dit zal in het begin vaker zijn dan wanneer u het medicijn al langer gebruikt.

Kan het gebruikt worden met andere medicijnen?

Febuxostat kan veilig worden gegeven naast de meeste andere geneesmiddelen. Febuxostat mag NIET gecombineerd worden met 6-mercaptopurine, azathioprine en/of didanosine vanwege de kans op ernstige bijwerkingen. Het wordt afgeraden febuxostat te gebruiken in combinatie met het medicijn theofylline. Het gebruik van febuxostat samen met rifampicine, carbamazepine, fenytoïne, fenobarbita en ritonavir, kan leiden tot een verminderde werking van febuxostat. Overleg met uw behandelaar bij verandering van uw medicatiegebruik.

Wat moet ik nog meer weten?

Alcohol

Er is geen bezwaar tegen (matig) alcohol gebruik tijdens behandeling met febuxostat. Alcoholische dranken met veel urinezuur, zoals bijvoorbeeld bier, kunnen wel een jichtaanval uitlokken.

Autorijden

Er is geen bezwaar tegen autorijden tijdens het gebruik van febuxostat.

Operaties en tandheelkundige ingrepen

Er zijn geen aanvullende maatregelen nodig bij operaties en andere (tandheelkundige) ingrepen.

Reizen

Bij reizen naar het buitenland is het raadzaam een actueel overzicht van uw medicijnen mee te nemen, het medicatie paspoort. Dit is verkrijgbaar bij uw apotheek of eventueel bij uw behandelaar.

Vaccinaties

Er is geen bezwaar tegen vaccinaties tijdens het gebruik van febuxostat.

Vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding

Van dit medicijn is niet bekend of het de vruchtbaarheid beïnvloedt.

Er is weinig informatie over de effecten van febuxostat tijdens zwangerschap. Febuxostat mag daarom niet tijdens de zwangerschap worden gebruikt.

Indien u plannen heeft om in de nabije toekomst zwanger te worden of onverwacht zwanger bent adviseren wij u dit kenbaar maken aan uw behandelaar.

Febuxostat komt in de moedermelk terecht en derhalve wordt het afgeraden febuxostat tijdens de borstvoeding te gebruiken.

Vragen

Wanneer u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft, zal uw behandelend reumatoloog deze graag beantwoorden.

Polikliniek reumatologie:

dr. E.A.J. Dutmer

dr. M.J. Rood

dr. J.N. Stolk

Telefoonnummer (0318) 43 43 43 / 43 53 00