

# Plexus coeliacus blokkade

**Deze behandeling kan worden toegepast bij ernstige pijnklachten van de bovenbuikorganen zoals de alvleesklier, de maag en de lever. Het betreft een blokkade van een zenuwnetwerk in de bovenbuik. Dit zenuwnetwerk wordt in medische termen 'plexus coeliacus' genoemd. Bij een meerderheid van de patiënten treedt na de blokkade een goede pijnvermindering op.**

### **Algemene informatie**

U wordt voorafgaand aan de behandeling tijdelijk opgenomen op de herstelkamer van ons behandelcentrum. De verpleegkundige haalt u op uit de wachtkamer en brengt u naar de herstelkamer. Daar worden uw gegevens genoteerd. U neemt plaats op een bed en u krijgt een operatiejasje aan. De assistentes van het Pijncentrum halen u op voor uw behandeling op de behandelkamer.

Na de behandeling gaat u weer naar de verpleegkundige op de herstelkamer. De behandeling duurt ongeveer een half uur.

### **Behandeling**

De behandeling wordt meestal onder lokale verdoving uitgevoerd en duurt ongeveer een half uur. Indien noodzakelijk en/ of wenselijk krijgt u een rustgevend middel. U neemt plaats in buikligging op de behandeltafel, er ligt een kussen onder uw buik. Onder röntgendoorlichting worden 1 of 2 naalden via de rug ingebracht. Via de naald(en) wordt contrastvloeistof ingespoten om de positie hiervan te controleren. Vervolgens wordt de behandelvloeistof rondom het zenuwnetwerk gespoten.

### **Complicaties**

Complicaties zijn zeldzaam en de arts voert de behandeling altijd zorgvuldig uit. Toch bestaat er een kleine kans op een aantal complicaties:

- een complicatie die zeer zelden voorkomt is een dwarslaesie (gedeeltelijke verlamming van beide benen). De kans daarop is uitermate klein
- een vaak voorkomende bijwerking is het tijdelijk optreden van diarree
- de eerste weken na de behandeling kunt u bij plotseling rechtop komen, even duizelig zijn
- een lokale infectie
- een lokale bloeding
- een allergische reactie

## Resultaat

Het resultaat van de blokkade is pas 1 of 2 dagen na de behandeling duidelijk. Bij een meerderheid van de patiënten treedt na de blokkade een goede pijnvermindering op. Het effect van de behandeling houdt gemiddeld enkele maanden aan en kan zo nodig herhaald worden. In een aantal gevallen is een aanvullende behandeling nodig.

## Attentie

- Informeer uw arts over een eventuele allergie voor jodium, contrastmiddel of medicijnen.
- Informeer uw arts over een eventuele zwangerschap in verband met de röntgenstraling die tijdens de behandeling gebruikt wordt.
- Als u antistollingsmiddelen / bloedverdunners gebruikt waarvoor controle bij de trombosedienst nodig is (Acenocoumarol/Sintrom of Fenprocoumon/Marcoumar), bespreek dit dan met uw arts. Over het algemeen mag u deze medicijnen door blijven gebruiken en krijgt u een recept voor vitamine K tablet/drank mee naar huis. Neem deze tablet/drank 36 - 48 uur voor de behandeling in. Het is belangrijk dat u op de dag van de behandeling eerst bloed laat prikken bij het laboratorium van Ziekenhuis Gelderse Vallei.
- Gebruikt u antistollingsmiddelen / bloedverdunners waarvoor geen controle nodig is bij de trombosedienst, bespreek dan met uw arts of u met deze medicijnen moet stoppen of kunt doorgaan.
- Na de behandeling mag u dezelfde dag niet zelfstandig aan het verkeer deelnemen.

*Indien u op de dag van de behandeling koorts heeft, verzoeken wij u om telefonisch contact op te nemen met uw behandelend arts.*

## Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Stel deze gerust aan de assistente van het Pijncentrum. Neem tussen 08.30 - 16.30 uur contact op met Pijncentrum Gelderse Vallei (0318) 43 43 45.

Zijn er binnen 24 uur na de behandeling problemen en valt dit buiten kantoor tijden? Neem dan contact op met de afdeling spoedeisende hulp (0318) 43 58 05.