

Nat verband

U heeft van ons een nat verband gekregen in verband met ontstekingsverschijnselen of om deze te voorkomen.

Het is van belang dat ook thuis het verband nat gehouden wordt.

Het verband moet iedere 2 uur vochtig (niet kletsnat) worden gemaakt met vers, stromend kraanwater (geen warm water). Ook 's nachts moet het verband 1 keer vochtig gemaakt worden. Het verband mag niet met plastic worden omwikkeld, omdat de wond dan gaat broeien.

Het is belangrijk dat de wond rust krijgt; voor een wond aan een hand of arm krijgt u een draagdoek, een been moet worden hoog gelegd.

Het kan voorkomen dat het bloed door het verband heen komt, dit is niet ernstig. U kunt er extra verband omheen wikkelen. Alleen als bloed uit het verband drupt moet u contact opnemen.

Pijnbestrijding

Bij pijnklachten kunt u Paracetamol gebruiken. Gebruik maximaal 4 keer per dag 2 tabletten van 500 mg (maximaal 8 tabletten per dag = 4000 mg).

Pijnbestrijding bij kinderen: kijk in de bijsluiters voor de juiste dosering.

Gebruikt u antibiotica, maak dan altijd de hele kuur af.

Vragen

Voor vragen kunt u van maandag t/m vrijdag van 08.30 - 17.00 uur contact opnemen met de polikliniek chirurgie, telefoonnummer (0318) 43 52 00.

Buiten deze uren met de spoedeisende hulp via telefoonnummer (0318) 43 58 05.

Wij wensen u van harte beterschap.