

# Bronchoscopie

**Hoe werken uw longen? Uw arts kan dit op verschillende manieren onderzoeken. Vanzelfsprekend kiest hij/zij voor het onderzoek dat het beste aansluit bij uw klachten en de ziekte die daar mogelijk de oorzaak van is.**

## **Vorbereiding**

Hoe moet u zich voorbereiden op dit onderzoek?

1. **U dient nuchter te zijn**, d.w.z. niet meer eten en drinken vanaf 00:00 uur (twaalf uur 's nachts)
2. Medicijnen die u thuis gebruikt neemt u mee naar het ziekenhuis.
3. Medicijnen die u 's morgens beslist wel moet innemen, kunt u met een weinig water gebruiken, maar verder moet u als boven vermeld nuchter blijven
4. Medicijnen voor **suikerziekte en/of plastabletten** dient u 's morgens **niet** in te nemen.
5. Medicijnen om te **inhaleren** kunt u gewoon gebruiken.
6. Zorg ervoor dat iemand u brengt en ook ophaalt.

## **Alleen van toepassing indien aangekruist:**

- In het scopiecentrum krijgt u bij aankomst medicijnen ter voorbereiding op het onderzoek. Zorg er voor dat iemand u ophaalt, omdat deze medicijnen de rijvaardigheid beïnvloeden.

## Het onderzoek

Datum: .....dag ...../.....20.....

Tijd onderzoek:..... uur, Ede.

Melden bij het scopiecentrum ..... uur.

U vindt deze afdeling op de eerste etage, B - vleugel, bestemming 104.

Melden bij de opname .....uur, in de centrale hal.

Men brengt u dan naar de betreffende afdeling.

U wordt naar de behandelkamer van het scopiecentrum gebracht. Eerst wordt de keel en soms ook de neus verdoofd met een spray. Voor uw gevoel wordt de keel dik, maar u kunt gewoon blijven slikken. Daarna wordt er nog wat vloeistof op uw stembanden gedruppeld.

Na het verdoven wordt er met de scoop gekeken. Er is meer dan voldoende ruimte over om rustig door te ademen. Tijdens de bronchoscopie kan slijm uit de luchtwegen worden verzameld voor onderzoeken. Ook kunnen kleine hapjes uit de luchtwegen worden genomen, hetgeen overigens ten gevolge van de verdoving geen pijn doet.

## Na het onderzoek

U mag na het onderzoek nog 1½ uur niet eten en drinken.

De reden hiervan is dat het klepje, waarmee de luchtwegen worden afgesloten, tijdelijk niet goed functioneert door de verdoving. Wanneer u dan iets zou eten of drinken, zou u zich heftig kunnen verslikken.

## **Uitslag**

U krijgt een afspraak mee voor een bezoek aan de behandelend arts. Dan krijgt u de uitslag te horen.

## **Vragen**

Als u nog vragen heeft over het onderzoek, dan kunt u deze stellen aan uw behandelend arts. Ook kunt u contact opnemen met het scopiecentrum, (0318) 43 41 70.