



Medicijnen bij cystenieren.

De laatste jaren is onderzoek uitgevoerd met twee nieuwe medicijnen die er op gericht zijn de groei van niercysten af te remmen. Daarmee vertraagt het de achteruitgang van de nierfunctie.

Tolvaptan

Tolvaptan is een vasopressine remmer.

Indicatie

Cystenieren.

Alléén voor volwassenen met chronische nierschade stadium 1-3 ten gevolge van cystenieren waarbij de ziekte snelle progressie (verslechtering) vertoont. Het mag niet gebruikt worden door vrouwen die zwanger willen worden, zwanger zijn of borstvoeding geven.

Voorschrift

Tolvaptan (Jinarc®).

Innameadvies

Het eerste tablet moet minimaal 30 minuten vòòr het ontbijt worden ingenomen. Het tweede tablet 8 uur later, met of zonder voedsel. Heel doorslikken.

Door tolvaptan neemt de urineproductie fors toe. Om uitdroging te voorkomen moet u direct water drinken bij de eerste tekenen van dorst. Drink altijd 1-2 glazen water voor het slapen gaan. Drink ook 's nachts om het verlies aan vocht via de urine te compenseren.

Bijwerkingen

- Vaak dorst en droge mond, veel en vaak plassen, ook 's nachts en daardoor gestoorde nachtrust en vermoeidheid.
- Regelmatig diarree, hoofdpijn, duizeligheid.



- Zelden kortademigheid, obstipatie, verminderde eetlust, gewichtsverlies, huiduitslag en jeuk, leverfunctiestoornissen, gewrichts- en spierpijn.

Heeft u last van koorts, pijn in de buik, donkere urine, gele verkleuring van uw huid of ogen (geelzucht), misselijkheid en braken, neem dan contact op met uw (huis)arts.

Let op



- Als u tolvaptan slikt, is het belangrijk géén grapefruit(sap)) en hieraan verwante fruitsoorten (zoals pomelo, tangelo, mineola, orlando, sweetie en bittersinaasappel (ook pomerans of zure oranje genoemd) en ugli) te gebruiken.
- Als het u niet lukt voldoende te drinken òf u verliest extra vocht door braken of diarree, dan loopt u het risico op uitdroging. Stop direct met het slikken van de tolvaptan en overleg met uw nefroloog!
- Tolvaptan wordt onder voorwaarde vergoed.



Lanreotide

Lanreotide is een somatostatine analoog, een groeiremmer. Dit middel wordt momenteel alléén nog voorgeschreven aan patiënten met cystenieren die aan wetenschappelijk onderzoek mee doen.

Indicatie

Cystenieren.

Voorschrift

Lanreotide (Somatuline®).

Innameadvies

Injectie 1x per week.

Bijwerkingen

- Soms diarree, buikpijn, dunne ontlasting.
- Zelden zwelling op de injectieplaats, maagdarmklachten (misselijkheid, braken, opgeblazen gevoel, winderigheid en verstopping), duizeligheid, hoofdpijn en vermoeidheid, gewichtsverlies, te hoog of te laag bloedglucosegehalte. De klachten kunnen na gewenning verminderen.