

# **Perifeer ingebrachte centrale katheter**

(PICC) Behandelkamer B1

## **Inhoud**


Inleiding	3
Wat is een PICC?	3
Hoe bereidt u zich voor?	3
Het inbrengen van de PICC	4
Deelname verkeer	4
De verzorging van de PICC	5
Verwijderen van de PICC	5
Aandachtspunten bij een PICC	5
Contact	6
Afspraak nacontrole	7

**Uw behandeld arts adviseert u een PICC in te laten brengen. Afhankelijk van uw situatie plaatst de chirurg de PICC tijdens uw ziekenhuisopname of er wordt een poliklinische afspraak gemaakt. In deze folder kunt u lezen wat een PICC is, hoe het inbrengen gaat en welke verzorging er nodig is.**

## **Wat is een PICC?**

PICC staat voor Perifeer Ingebrachte Centrale Catheter.

Een PICC is een dunne flexibele buis die wordt ingebracht in een ader in de bovenarm. Deze eindigt net boven het hart. Dit is het gedeelte binnen in het lichaam. De katheter komt als een slangetje uit de arm, het uitwendige gedeelte. Hierop kan een infuus aangesloten worden.



Via de PICC krijgt u bijvoorbeeld medicijnen, bepaalde voeding of bloedtransfusies. U krijgt de PICC omdat uw medicijnen niet via een gewoon infuus gegeven kunnen worden, of omdat het bij u moeilijk is om een gewoon infuus te prikken. Wanneer het bloedprikken op het laboratorium moeilijk gaat, kan er via de PICC bloed afgenomen worden. Een PICC kan enkele maanden blijven zitten.

## **Hoe bereidt u zich voor?**

U hoeft voor de ingreep niet nuchter te zijn. Na de ingreep kunt u niet zelf aan het verkeer deelnemen. Laat iemand met u meekomen die u na de ingreep met een rolstoel naar de auto kan brengen. U kunt bij binnenkomst van het ziekenhuis vast een rolstoel meenemen.

De ingreep vindt plaats op het behandelcentrum, vleugel B, 1ste etage, bestemming 110.

## **Het inbrengen van de PICC**

De PICC lijn wordt onder lokale verdoving bij u ingebracht.

De chirurg prikt met behulp van een echoapparaat een geschikt bloedvat aan. Vervolgens brengt hij de katheter in en schuift deze op. Het uitwendige gedeelte van de katheter wordt afgeplakt met een doorzichtige pleister.

De behandeling duurt ongeveer 30 tot 60 minuten.

Tenslotte wordt er een röntgenfoto gemaakt om de plaats van de katheter te controleren.

Het verblijf in het ziekenhuis is gemiddeld twee uur.

## **Deelname verkeer**

De eerste 24 uur na de ingreep kunt u niet deelnemen aan het verkeer. Zorg er daarom voor dat iemand u ophaalt of neem eventueel een taxi. De receptioniste in de centrale hal kan die voor u bestellen.

## **De verzorging van de PICC**

Maximaal 24 uur na het inbrengen van de PICC verwisselt de verpleegkundige het verband. Dit kan zijn tijdens uw ziekenhuisopname, anders krijgt u een afspraak mee voor de volgende dag.

Daarna moet de PICC één keer per week worden verzorgd. Wanneer u in het ziekenhuis een infuus krijgt via de PICC, verzorgt de verpleegkundige de PICC meteen.

Komt u niet voor behandeling in het ziekenhuis, dan komt een verpleegkundige van de thuiszorg dit bij u doen.

## **Verwijderen van de PICC**

Als de PICC niet meer nodig is, haalt de arts of verpleegkundige deze er weer uit. Dit is een kleine handeling die poliklinisch plaats vindt.

## **Aandachtspunten bij een PICC**

- houd de insteekopening droog. Douchen mag, wikkel dan huishoudfolie om u arm heen zodat de insteekopening droog blijft. Baden en saunabezoek mag niet
- gebruik de arm waar de PICC in zit normaal. Ontzie de arm bij opdrukken (bijvoorbeeld in bed) en zwaar tillen
- laat **geen** bloeddruk meten aan de arm met de PICC
- laat **geen** bloed prikken aan de arm met de PICC
- duw de PICC niet zelf terug wanneer deze verschoven is. Plak de PICC met een pleister vast en neem contact op met het ziekenhuis

## Contact

Heeft u *vragen over het inbrengen van de PICC lijn* belt u dan naar de polikliniek chirurgie, (0318) 43 43 45.

Zij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag, van 08.30 tot 17.00 uur.

*Zolang u een PICC heeft, is het belangrijk eventuele klachten snel door te geven.* Neem in de volgende gevallen *altijd* contact op met het ziekenhuis (zie onderstaande telefoonnummers van de diverse afdelingen):

- roodheid, pijnklachten en zwelling rondom de insteekopening
- pijn of zwelling van de bovenarm, nek of borstkas
- koorts boven de 38,5 of koude rillingen
- kortademigheid of hoesten
- vocht of bloed bij de insteekopening
- verplaatsing van de lijn of beschadiging van de lijn (een gaatje of barstje)

Bent u onder behandeling van een **oncoloog**? Neemt u dan contact op via de volgende telefoonnummers:

- Maandag tot en met vrijdag 07.30 - 17.00 uur, dagbehandeling oncologie, (0318) 43 48 33.  
Bij voorkeur tijdens telefonisch spreekuur van 8.30 - 09.00 uur of van 11.00 - 11.30 uur
- Buiten kantoortijden: afdeling oncologie, (0318) 43 48 30.

Bent u onder behandeling van een **cardioloog**? Dan kunt u contact opnemen met de Eerste Hart Hulp, (0318) 43 59 22.

Bent u onder behandeling van een **andere specialist**? Neemt u dan contact op via de volgende telefoonnummers:

- Tijdens kantoortijden met de polikliniek van de betreffende specialist.
- Buiten kantoortijden: de Spoed Eisende Hulp, (0318) 43 58 05.

**Afspraak nacontrole**

Nacontrole Dagverpleegkundige oncologie

Nacontrole Cardioloog

Nacontrole .....

Dag.....

Tijd:.....

Bestemmingnummer:.....