

Histamineprovocatie test/ Allergietest

Hoe werken uw longen? Uw arts kan dit op verschillende manieren onderzoeken. Vanzelfsprekend kiest hij/zij voor het onderzoek dat het beste aansluit bij uw klachten en de ziekte die daar mogelijk de oorzaak van is.

O Histamineprovocatietest

De histamineprovocatietest is een onderzoek om verhoogde prikkelbaarheid van de luchtwegen vast te stellen.

Vorbereiding

U mag gewoon eten en drinken voor het onderzoek.

Het is belangrijk dat u even rustig zit voordat u aan het onderzoek begint.

Daarom vragen wij u op tijd te komen.

Het goed slagen van de test is mede afhankelijk van medicijngebruik.

Stop 3 dagen vóór het onderzoek met het gebruik van antihistaminica (allergietabletten).

Hieronder is aangekruist wat voor u nog meer van toepassing is:

- Longmedicatie doorgebruiken
- 24 uur tevoren geen inhalatiemedicatie gebruiken

Het onderzoek

Tijdens het onderzoek zit u op een stoel. U ademt via een mondstuk, dat is verbonden met een meetapparaat. U krijgt een klemmetje op de neus om te voorkomen dat u door uw neus ademt. Bij het begin van de test vraagt de longfunctieanalist u een paar keer diep in te ademen en zo krachtig mogelijk uit te ademen. Daarna ademt u lucht in die histamine bevat. De hoeveelheid hiervan wordt stapsgewijs verhoogd.

Indien er sprake is van overgevoeligheid, kunt u last krijgen van hoesten, kortademigheid of een piepende ademhaling.

Vervolgens krijgt u een luchtwegverwijdend medicijn toegediend, waardoor eventuele klachten weer verdwijnen.

Na het onderzoek kunt u lichte keelpijn, heesheid of prikkelhoest ervaren.

Het totale onderzoek duurt ongeveer één uur.

O Allergietest

De allergietest wordt gedaan om vast te stellen of er sprake is van een allergische reactie op inhalatieallergenen.

Vorbereiding

U mag gewoon eten en drinken voor het onderzoek.

Het goed slagen van de test is mede afhankelijk van medicijngebruik.

U moet 3 dagen vóór het onderzoek stoppen met het gebruik van antihistaminica (allergietabletten). Ook moet u 3 dagen vóór het onderzoek geen zalf/crème op uw armen gebruiken die corticosteroiden bevatten.

Het onderzoek

Er worden gemiddeld 12 druppeltjes vloeistof aangebracht op uw arm. Vervolgens worden deze lichtjes doorgeprikt. Na een kwartier kan er een eventuele reactie worden waargenomen. Het totale onderzoek duurt ongeveer een half uur.

Uitslag

U krijgt de uitslag van de histamineprovocatietest en/of allergietest van uw behandelend arts.

Vragen

Als u nog vragen heeft over het onderzoek, dan kunt u deze stellen aan uw behandelend arts. Ook kunt u contact opnemen met de afdeling longfunctie, (0318) 43 53 10.

De afdeling longfunctie kunt u vinden in de A vleugel op de begane grond, bestemming 37.