

Radio Frequente SI blokkade / Pallisade

Via Vivre

Inhoud

Inleiding	3
Algemene informatie	3
Vorbereiding	3
Behandeling	4
Complicaties	4
Bijwerkingen	4
Resultaat	4
Organisatie	5
U wordt (terug) verwacht voor pijnbestrijding:	6
Attentie	6
Vragen	7

In overleg met uw arts is er besloten dat u in verband met uw pijnklachten een definitieve Sacro-iliacale blokkade door middel van een pallisade RF behandeling zult ondergaan. Bij deze behandeling wordt een laesie gecreëerd door middel van radio frequente stroom tussen twee naalden, er worden meerdere naalden geplaatst.

Algemene informatie

- De behandeling vindt poliklinisch plaats. U kunt zich melden bij de assistente van Pijncentrum Gelderse Vallei, vleugel B, 1^e verdieping, bestemming 111. Na de behandeling mag u direct weer naar huis, tenzij uw behandelend arts het raadzaam vindt dat u nog even bij de verpleegkundige op de herstelkamer van ons behandelcentrum plaats neemt.
- De behandeling kan plaatsvinden ter hoogte van de nek, borstkas of lage rug.

Vorbereiding

- U kunt voor de behandeling gewoon eten en drinken.
- U kunt uw medicatie gewoon innemen, ook uw pijnmedicatie, tenzij arts anders met u heeft afgesproken.
- Indien u sintrom (of andere anti-stollingsmiddelen, waarvoor u bekend bent bij de trombosedienst) gebruikt, moet u dit altijd aan de arts melden. Alle andere bloedverdünnende medicatie (ook ascal) kunt u gewoon blijven innemen, behalve als de behandelend arts iets anders met u heeft afgesproken.
- Indien u zwanger bent of denkt te zijn, meldt u dit dan vóór de behandeling aan de behandelaar.
- Wij adviseren u makkelijke, loszittende kleding te dragen.
- Na de behandeling mag u dezelfde dag niet zelfstandig aan het verkeer deelnemen, neem dus iemand mee die u thuis brengt.

Behandeling

U neemt in de buikligging plaats op de behandeltafel. U heeft dan een kussen onder uw buik liggen. De assistente plakt een zogenaamde aardplaat op uw arm of been, waardoor u 'geaard' bent aan het apparaat. De arts plaatst onder röntgendoorlichting 6 naalden. Vervolgens wordt de positie van de naaldpunten gecontroleerd door toediening van kleine teststroomstootjes. U kunt hierbij tintelingen voelen, een drukkend gevoel ervaren en klopbewegingen voelen. U dient goed te antwoorden op de vragen die de arts stelt. Als de positie juist is, wordt lokaal, via het naaldje, het te behandelend gebied verdoofd. Dan begint de daadwerkelijke behandeling. Als er tussen de eerste twee naalden een laesie is aangebracht vindt er weer een laesie plaats tussen de naalden twee en drie, enzovoort, totdat tussen alle naalden een laesie is aangebracht. De behandeling duurt ongeveer 30 minuten.

Complicaties

Complicaties zijn zeldzaam en de arts voert de behandeling altijd zorgvuldig uit. Toch bestaat er een geringe kans op een complicatie:

- een lokale infectie
- een lokale bloeding
- een allergische reactie

Bijwerkingen

- Er kan een tijdelijke gevoelsvermindering optreden in de huid in de buurt van de behandelde plek. In de loop van enkele weken keert het gevoel vanzelf langzaam terug.
- U kunt last krijgen van napijn na de behandeling. Deze napijn kan maximaal enkele weken aanhouden, maar is altijd van tijdelijke aard. U kunt hiervoor eventueel een pijnstiller innemen, bijvoorbeeld Paracetamol.

Resultaat

Na ongeveer 8 weken is het zinvol om het resultaat van de behandeling te beoordelen. Het is goed mogelijk dat u al eerder minder pijnklachten heeft.

Organisatie

Op het Pijncentrum Gelderse Vallei werken anesthesiologen*, pijnconsulenten, verpleegkundigen en assistenten. De patiënten die de polikliniek bezoeken worden door verschillende artsen doorverwezen. Dit kunnen onder andere de huisarts, neuroloog, orthopeed of internist zijn.

Iedere anesthesioloog (pijnbestrijder) heeft een vaste dag op het Pijncentrum Gelderse Vallei.

- | | |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| <input type="radio"/> Dhr. v.d. Beek | <input type="radio"/> Maandag |
| <input type="radio"/> Dhr. Bertina | <input type="radio"/> Dinsdag |
| <input type="radio"/> Dhr. v. Druenen | <input type="radio"/> Woensdag |
| <input type="radio"/> Dhr. Frowijn | <input type="radio"/> Donderdag |
| <input type="radio"/> Dhr. Heijmer | <input type="radio"/> Vrijdag |
| <input type="radio"/> Dhr. Siemonsma | |
| <input type="radio"/> Mevr. Vissia | |

* = Er werken ook anesthesiologen in opleiding in Ziekenhuis Gelderse Vallei die onder supervisie van één van de anesthesiologen, het intakegesprek, het onderzoek en de behandeling uitvoeren.

U wordt (terug) verwacht voor pijnbestrijding:

Datum:dag/...../20.....

Tijd:uur.

Deze behandeling valt buiten het basispakket van de zorgverzekering, waardoor u de behandeling zelf vooraf moet betalen. Sommige aanvullende verzekeringen vergoeden (een deel van) deze behandeling. De intake en poliklinische controles vallen wel onder de verzekerde zorg in het basispakket.

De anesthesioloog verricht de behandeling in het Pijncentrum Gelderse Vallei, maar de financiële administratie wordt verzorgd door Gelderse Vallei Vivre. Gelderse Vallei Vivre is de privékliniek van Ziekenhuis Gelderse Vallei. De medewerkers van Gelderse Vallei Vivre voorzien u van informatie over de kosten en betaling van de ingreep.

U vindt Gelderse Vallei Vivre in vleugel B, 1^e verdieping, bestemming 108.

Attentie

- Informeer uw arts over een eventuele allergie voor jodium, contrastmiddel of medicijnen.
- Informeer uw arts over een eventuele zwangerschap in verband met de röntgenstraling die tijdens de behandeling gebruikt wordt.
- Indien u antistollingsmiddelen gebruikt (Acenocoumarol/ Sintrom of Fenprocoumon/Marcoumar), waarvoor controle bij de trombosedienst noodzakelijk is, bespreekt dit dan met uw arts. Over het algemeen mag u deze door blijven gebruiken en krijgt u een recept voor een vitamine k tablet/drank. Die neemt u 36 uur voor de behandeling in. Ook is het belangrijk dat op de dag van de behandeling uw bloed op het laboratorium gecontroleerd wordt.
- Gebruikt u antistollingsmiddelen waarvoor geen controle nodig is bij de trombosedienst (Ascal; Acetylsalicylzuur of Plavix), bespreek dan met uw arts of u hiermee moet stoppen of kunt doorgaan.
- Na de behandeling mag u dezelfde dag niet zelfstandig aan het verkeer deelnemen omdat u last kunt krijgen van kortdurende krachtsvermindering van de benen.

Indien u op de dag van de behandeling koorts heeft, verzoeken wij u om telefonisch contact op te nemen met uw behandelend arts.

Vragen

Indien u vragen heeft kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met het Pijncentrum Gelderse Vallei, (0318) 43 58 70.

Indien u vragen heeft over de financiën kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met Gelderse Vallei Vivre, (0318) 43 48 90.