

Bijlage 1. STRONG_{kids}: Screening op ondervoedingsrisico bij kinderen van 1 maand tot 18 jaar⁵

Vragen < 24 uur na opname en vervolgens 1x/week	Score indien ja
1. Is er sprake van een ziektebeeld met een verhoogd risico op ondervoeding? (zie tabel)	2
2. Verkeert de patiënt op basis van uw klinische blik in een slechte voedingstoestand: ingevallen gelaat en/of verlies subcutaan vet en/of verlies spiermassa?	1
3. Is er sprake van minimaal 1 van onderstaande punten: - Diarree (>5x daags dunne ontlasting) en/of braken (>3x daags) gedurende de laatste 1-3 dagen. - Bestaande voedingsinterventie met drink- of sondevoeding. - Duidelijk verminderde inname gedurende de laatste 1-3 dagen. - Belemmering van voedselinname door pijn.	1
4. Is er sprake van gewichtsverlies (alle leeftijden) en/of stilstand in groei/gewicht (kinderen < 1 jaar) gedurende de laatste weken tot maanden?	1

Totaalscore: maximaal 5 punten

Risicovolle ziektebeelden			
<ul style="list-style-type: none"> • Psychiatrische eetstoornissen • Brandwonden • Bronchopulmonale dysplasie (< 2 jaar) • Coeliakie (actief) • Cystische fibrose 	<ul style="list-style-type: none"> • Dysmaturitas/prematuritas (tot 6 mnd gecorrigeerde leeftijd) • Hartziekten, chronisch • Infectieziekten • Inflammatoire darmziekten • Kanker 	<ul style="list-style-type: none"> • Leverziekten, chronisch • Nierziekten, chronisch • Niet nader gespecificeerd (inschatting arts) • Pancreatitis • Korte darmsyndroom 	<ul style="list-style-type: none"> • Spierziekten • Stofwisselingsziekten • Trauma • Verstandelijke handicap/retardatie • Verwachte grote operatie

Risico op ondervoeding en bijbehorend voedingsadvies		
4-5 punten	Hoog risico	<ul style="list-style-type: none"> • Specifiek voedingsadvies in overleg met diëtist • Controleer gewicht 2x/week en evalueer voedingsadvies • Evalueer risico na 1 week
1-3 punten	Matig risico	<ul style="list-style-type: none"> • Overleg voedingsbeleid, evt. met diëtist • Controleer gewicht 2x/week • Evalueer risico na 1 week
0 punten	Laag risico	<ul style="list-style-type: none"> • Geen voedingsinterventie • Controleer gewicht regelmatig • Evalueer risico na 1 week