

Cystoscopie

Blaasonderzoek

Uw behandelend arts heeft met u een cystoscopie (blaasonderzoek) afgesproken. Bij een cystoscopie bekijkt de uroloog de binnenkant van uw blaas en de urineweg (plasbuis) en bij mannen ook de prostaat.

Dit gebeurt met behulp van een dunne buis of slang (cystoscoop) waaraan een kijker en lichtbron zijn bevestigd. In deze folder kunt u lezen wat u kan verwachten.

Vorbereiding thuis

U mag gewoon eten, drinken en medicijnen gebruiken. Indien u bloedverdunnende medicijnen (Sintrom, Sintrommitis of Marcoumar) gebruikt, mag u deze gewoon doorgebruiken. Tenzij de arts iets anders met u heeft afgesproken. Voor vrouwen: menstruatie tijdens het onderzoek is geen belemmering.

Dag van het onderzoek

Op de afgesproken tijd meldt u zich aan de balie van de polikliniek urologie, richting vleugel B, begane grond, bestemming 102. Denkt u eraan uw polikliniekaart mee te nemen.

Vorbereiding

Nadat u zich gemeld heeft, wacht u in de wachtruimte tot een polikliniekassistent u komt halen. In de kleedruimte ontkleedt u uw onderlichaam (uw kousen kunt u aanhouden).

In de onderzoekkamer gaat u liggen op een onderzoektafel. Deze tafel heeft aan het voeteneinde links en rechts een beensteun waar u de benen in legt. De assistent reinigt de uitgang van uw plasbuis met water. Bij mannen wordt de plasbuis verdoofd door het inbrengen van een vloeistof die tevens glijmiddel is. Vervolgens dekt de polikliniekassistent het onderlichaam af met een steriele doek.

Het onderzoek

De uroloog brengt de dunne buis of slang (cystoscoop) via de plasbuis in de blaas. Bij mannen wordt meestal, afhankelijk van de reden van het onderzoek, gebruik gemaakt van een flexibele cystoscoop.

Het bekijken van de binnenkant van de blaas kan alleen als deze gevuld is. Daarom laat de uroloog de blaas vollopen met steriel water. Na het onderzoek laat de uroloog het water uitlopen en wordt de cystoscoop verwijderd, of wordt u verzocht om uit te plassen op een apparaat, dat de urinestraal meet.

Als u tijdens het onderzoek aandrang heeft om te plassen, wilt u dan de arts of assistent waarschuwen? Het onderzoek kan een vervelend gevoel geven, maar is niet pijnlijk. Probeer u zich tijdens het onderzoek zoveel mogelijk te ontspannen.

Het gehele onderzoek duurt ongeveer 5 á 10 minuten. De uitslag van het onderzoek krijgt u meteen te horen van uw specialist.

Na het onderzoek

- Het is belangrijk dat u veel drinkt. Doordat u veel plast, worden de blaas en de urinewegen schoongespoeld en dit kan een infectie voorkomen. Gebruik zo min mogelijk koolzuur houdende dranken omdat deze al snel een vol gevoel geven.
- U kunt nog enige tijd last hebben van een branderig gevoel voor en tijdens het plassen of het gevoel dat u steeds moet plassen. Dit komt doordat de plasbuis is geïrriteerd door het inbrengen van de cystoscoop.
- Het is mogelijk dat er tijdens het onderzoek een bloedvatje is geraakt waardoor uw urine rood wordt. Na twee dagen is dit meestal over. Duurt het bloeden echter langer dan twee dagen of komt er steeds meer bloed bij de urine, dan moet u een afspraak maken bij de uroloog.
- Ook wanneer u na het onderzoek veel pijn heeft of koorts krijgt, moet u contact opnemen met de polikliniek urologie. Het is mogelijk dat u dan een infectie (ontsteking) aan de urineweg heeft. Hiervoor krijgt u medicijnen.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, stelt u ze dan gerust aan de uroloog of aan de polikliniekassistent die bij het onderzoek aanwezig is.

U kunt op werkdagen tussen 08.30 - 12.30 uur en 13.30 - 16.30 uur bellen naar de polikliniek urologie, (0318) 43 51 00.