

Ectropion of entropion

Uw plastisch chirurg heeft bij u een uitgedraaid onderooglid geconstateerd. Dit heet ook wel ectropion of entropion. In deze folder kunt u lezen wat ectropion of entropion is en wat de behandeling inhoudt.

Wat is ectropion of entropion?

De oogleden aan de onderkant van het oog kunnen naar binnen of naar buiten draaien. Dit gebeurt vooral op oudere leeftijd. Bij een ectropion is het onderooglid naar buiten gedraaid. Dit zorgt vaak voor irritatie zoals tranen, roodheid en gevoeligheid voor fel licht en wind. Bij een entropion is het onderooglid naar binnen gedraaid. Hierbij zien we een rood, geïrriteerd oog en kan het hoornvlies beschadigd raken. Een operatie kan deze problemen verhelpen.

Vóór de operatie

Overleg over uw medicijngebruik

Gebruikt u medicijnen? Vertel dan vóór de operatie aan uw plastisch chirurg welke medicijnen u gebruikt. Gebruikt u bloedverdunnende middelen, zoals Ascal/ acetylsalicylzuur of Plavix? Dan kan het zijn dat u hiermee tijdelijk moet stoppen in de 7 dagen vóór de operatie. Zo voorkomt u een bloeding of bloeduitstorting. Overleg hierover eerst met de arts die deze medicijnen heeft voorgeschreven. Hij of zij bespreekt met u of u (tijdelijk) met deze medicijnen moet stoppen.

Als u bij de trombosedienst komt

Komt u bij de trombosedienst voor de dosering van uw bloedverduuners, zoals acenocoumarol of marcoumar? Neem dan vóór de operatie contact op met de trombosedienst. Zij geven u een recept voor vitamine K. Dit moet u 30 uur voor de operatie innemen.

Verwijder sieraden en make-up

U mag geen sieraden dragen aan de hand waaraan u geopereerd wordt. Ook nagellak en kunstnagels zijn niet toegestaan.

Stop (tijdelijk) met roken

Rookt u? Dan is het verstandig om hiermee (tijdelijk) te stoppen. Mensen die roken, lopen meer kans op complicaties na de operatie. Probeer daarom te stoppen met roken vanaf enkele weken voor de operatie tot (in ieder geval) 3 weken na de operatie.

De operatie

De operatie vindt plaats onder plaatselijke verdoving. U krijgt de verdoving via een injectie (spuitje).

Bij de operatie van een entropion wordt het ooglid aan de buitenooghoek iets ingekort en vervolgens aan de buitenooghoek weer vast gehecht. Ook wordt de spier die het onderooglid naar buiten draait strakker gezet. Dit gebeurt met behulp van hechtingen.

Na de operatie

Een week na de operatie komt u terug om de hechtingen te laten verwijderen en om de wond te laten controleren.

Gevolgen en risico's

Zoals bij iedere operatie bestaat ook bij deze ingreep een klein risico van complicaties. Zoals een nabloeding, bloeduitstorting, wondinfectie of verdere problemen met de wondgenezing.

Bij pijn, zwelling of koorts

Krijgt u binnen 24 uur na de ingreep last van abnormale pijn, ernstige zwelling of koorts? Bel dan de spoedeisende hulp: (0318) 43 43 43. Krijgt u na 24 uur last van deze klachten? Neem dan contact op met de polikliniek plastische chirurgie: (0318) 43 52 70. Buiten kantoor tijden kunt u de huisartsenpost bellen: (0318) 200 800.

Vragen?

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan gerust contact op met de polikliniek plastische chirurgie. U kunt ons bereiken op werkdagen tussen 08.30 -17.00 uur via het telefoonnummer (0318) 43 52 70.

Waar en wanneer wordt u geopereerd?

De behandeling vindt plaats bij Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede (kort verblijf); u ontvangt hiervoor schriftelijk een afspraak. Het kan voorkomen dat de arts die u tijdens het spreekuur op de polikliniek heeft gezien, niet de arts is die de operatie uitvoert.