

## VANCOMYCINE (VANCOCIN®)

<b>Afleveringsvorm</b>	Injectieflacon met 500 mg vancomycine poeder (als hydrochloride).
<b>Oplosmiddel</b>	Water voor injecties.
<b>Klaarmaken</b>	Los op met behulp van 10 ml water voor injecties.
<b>Toediening i.m.</b>	Niet mogelijk.
<b>Toediening i.v.</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>Rechtstreekse intraveneuze injectie: niet mogelijk</li><li>Verdund als kortlopend infuus: Voeg doseringen <math>\leq</math> 500 mg toe aan 100 ml NaCl 0,9% of glucose 5%. Inlooptijd: 1 uur Voeg doseringen <math>&gt;</math> 500 mg toe aan <u>minimaal</u> 200 ml NaCl 0,9% of glucose 5%. Inlooptijd: 2 uur</li><li>Per continu infuus: zie het schema op de volgende pagina.</li><li>Tijdens hemodialyse: laat het infuus gedurende het laatste uur van de dialyse inlopen. Voeg doseringen <math>\leq</math> 500 mg toe aan 100 ml NaCl 0,9% of glucose 5%. Voeg doseringen <math>&gt;</math> 500 mg toe aan <u>minimaal</u> 200 ml NaCl 0,9% of glucose 5%.</li></ol>
<b>Wet B.I.G.</b>	Een directe intraveneuze bolusinjectie van dit middel is niet van toepassing.
<b>Kans op flebitis</b>	Vancomycine is een voor weefsels zeer irriterende stof, zodat de kans op flebitis vrij groot is. Bij langer durende toepassing wordt aanbevolen vancomycine toe te dienen via een centrale catheter, of het perifere infuus regelmatig om te zetten naar een andere plaats. Een alternatief is het toedienen in een groter volume, wanneer irritatie begint op te treden.
<b>Houdbaarheid</b>	Zowel in de flacon, opgelost met water, als na verdunning in een infuus, geldt een houdbaarheid van 24 uur in de koelkast.
<b>Onverenigbaarheden</b>	Raadpleeg de mengbaarheidstabel en zonodig een apotheker.
<b>Hulpstoffen</b>	geen