

# **CT onderzoek bij allergie voor jodiumhoudend contrastmiddel**

**Binnenkort wordt er een CT-scan van u gemaakt waarbij u een jodiumhoudend contrastmiddel toegediend krijgt in de bloedvaten. In deze folder leest u meer over het verloop van het onderzoek in combinatie met uw allergie.**

## **Overgevoeligheid/allergie**

U heeft in het verleden een allergische reactie op contrastmiddel doorgemaakt. Om het risico op een contrastreactie tot een minimum te beperken heeft uw specialist een opname met voorbereiding voor u afgesproken.

## **Vorbereiding**

### *Dag van het onderzoek*

U meld zich 2 uur voor de afspraaktijd bij de receptie in de centrale hal. Zij wijzen u de weg naar de verpleegafdeling. Hier krijgt u een infuus met prednison.

10 min voor de afspraaktijd wordt u door de patiëntenvervoersdienst naar de afdeling radiologie gebracht. U krijgt een ampul Tavegil mee. Daar wacht u in de wachtruimte van de CT tot de laborant u komt halen.

## **Hoe verloopt het onderzoek**

### *Voor de CT-scan*

Voordat gestart wordt met het onderzoek krijgt u van de radiodiagnostisch laborant de meegebrachte ampul Tavegil via het infuus toegediend. Dit is bedoeld om ernstige overgevoeligheidsreacties te voorkomen. Hierna kan de contrast vloeistof toegediend worden en kan de scan worden gemaakt.

### *Na de CT-scan*

U krijgt na de scan op de verpleegafdeling enkele controles van onder andere de bloeddruk en het advies om goed te drinken. U blijft ongeveer nog een uur op de afdeling ter observatie.

De toegediende medicatie kan het reactievermogen verminderen. U dient hiermee rekening te houden bij activiteiten die een grote mate van oplettendheid vereisen, zoals deelname aan het verkeer of het bedienen van machines etc. Zo nodig moet van dit soort bezigheden worden afgezien. Gebruik geen machines en bestuur geen auto of ander voertuig, als u last krijgt van bijwerkingen zoals slaperigheid of duizeligheid.