

MyoSure

Behandeling verwijderen vleesbomen
of poliepen

U heeft een afspraak met de gynaecoloog voor de MyoSure behandeling. Dit is een eenvoudige behandeling voor het verwijderen van vleesbomen (myomen) of poliepen via de natuurlijke opening van de baarmoedermond. Na deze behandeling kunnen vrouwen nog steeds zwanger worden. De behandeling vindt poliklinisch plaats, waardoor u nog dezelfde dag naar huis kunt.

Vorbereiding

U kunt tijdens en na de behandeling last hebben van menstruatieachtige krampen. Die verschillen in hevigheid per patiënt. De avond voor, en een uur voor de behandeling dient u een zetpil Diclofenac 100 mg toe. Het recept hiervoor heeft u tegelijkertijd met uw afspraak voor de MyoSure behandeling gekregen. Dit medicijn vermindert de kramp tijdens en na de behandeling.

Als u menstruaties heeft, vindt de behandeling in de eerste helft van de cyclus (vóór de eisprong) plaats, zodat u niet zwanger kunt zijn ten tijde van het onderzoek en er geen dik slijmvlies aanwezig is. Hiermee moet u bij het maken van de afspraak rekening houden.

De behandeling

De MyoSure behandeling vindt plaats op het behandelcentrum in de B vleugel 1^e etage bestemming 110 en duurt over het algemeen 10 tot 20 minuten. Uw partner mag bij de behandeling aanwezig zijn. Soms is het nodig om een plaatselijke verdoving te geven en de baarmoedermond iets te verwijderen voordat de camera ingebracht kan worden.

De gynaecoloog brengt via de vagina een kleine camera (6,5 mm in doorsnede) in om de binnenkant van de baarmoedermond en baarmoeder te bekijken. Vervolgens brengt de gynaecoloog het instrument in om de poliep/vleesboom in de baarmoeder te verwijderen. Via een opening aan de zijkant van het uiteinde van het instrument wordt de poliep of vleesboom in kleine stukjes verwijderd. Het weefsel wordt gelijk via het instrument opgezogen en uit de baarmoeder verwijderd. Als de poliep of vleesboom volledig verwijderd is, haalt de gynaecoloog het instrument uit de baarmoeder. Het verwijderen van het weefsel is zelden pijnlijk. Wel kunt u pijnlijke krampen voelen van de baarmoeder.

Na de behandeling

Na de behandeling kleedt u zich weer aan. U kunt nog vocht uit de vagina verliezen, waarvoor u een maandverband kunt gebruiken. In een aparte ruimte kunt u even tot rust komen. De assistent belt u de zelfde dag om te vragen hoe het met u gaat en geeft u dan de afspraak voor controle.

Risico's van de MyoSure behandeling

Risico's van de behandeling zijn perforatie van de baarmoeder, bloedingen, infecties en verwondingen aan organen in de onderbuik en het bekken. Lichte krampen en licht ongemak kunnen na de behandeling optreden. Bij vloeistofoverbelasting (als er teveel vocht in het lichaam achterblijft) wordt de behandeling gestaakt.

Belangrijk

- U kunt last krijgen van een krampende pijn van de baarmoeder. Eventueel kunt u 2 uur na de behandeling een zetpil diclofenac toedienen. Zo nodig kunt u 4 uur later eventueel een paracetamol innemen.
- De eerste dag na de behandeling heeft u nog wat helderrood bloedverlies als gevolg van het inbrengen van de MyoSure.
- Daarna heeft u waterige/bloederige afscheiding. Dit kan enkele dagen tot soms weken duren.
- De meeste vrouwen kunnen binnen één dag hun normale activiteiten weer hervatten.
- Zodra u niet meer vloeit kunt u weer geslachtsgemeenschap hebben. Ook is in bad gaan ook geen bezwaar meer.
- Na de behandeling blijft eventuele anticonceptie nodig.

Complicaties

U moet contact opnemen met het ziekenhuis wanneer:

- u meer dan 38 graden koorts heeft
- de pijnklachten verergeren en voorgeschreven medicijnen niet helpen
- u misselijk, kortademig of duizelig bent
- u moet overgeven
- u darm- of blaasproblemen krijgt.
- u een onaangenaam ruikende vaginale afscheiding heeft

Krijgt u de eerste 14 dagen na de behandeling problemen die te maken hebben met de behandeling?

Neem dan contact op met het ziekenhuis:

- op maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 en 17.00 uur belt u met de polikliniek gynaecologie, (0318) 43 51 50
- buiten deze tijden belt u met het ziekenhuis (0318) 43 43 43

Vragen

Heeft u nog vragen? Stel ze gerust. Polikliniek gynaecologie is op werkdagen bereikbaar op (0318) 43 51 50.