

# Plaveiselcelcarcinoom

**U bent door uw huisarts of dermatoloog verwezen naar de plastisch chirurg voor het verwijderen van een plaveiselcelcarcinoom (pcc). In deze folder leest u wat plaveiselcelcarcinoom is, hoe de diagnose wordt gesteld en hoe de behandeling verloopt.**

Het plaveiselcelcarcinoom van de huid is een kwaadaardige tumor. Deze vorm van huidkanker ontstaat in de opperhuid, mede onder invloed van zonlicht. Soms zaait het zich uit naar de lymfeklieren en andere organen. Er bestaat ook een oppervlakkige vorm van plaveiselcelcarcinoom die zelden kwaadaardig gedrag vertoont. Deze vorm heet intra-epidermaal plaveiselcelcarcinoom of ziekte van Bowen. Het plaveiselcelcarcinoom kenmerkt zich door een rozerood knobbeltje, soms met een schilferend korstje erop.

### **Behandeling**

Bij de operatie wordt het plaveiselcarcinoom onder plaatselijke verdoving, dan wel onder algehele narcose verwijderd. Indien het plaatselijk verdoofd wordt, vindt de behandeling plaats op de polikliniek plastische chirurgie. Onder algehele narcose is de behandeling op (de dagebehandeling) kort verblijf. In sommige gevallen is het niet mogelijk de wondranden direct te sluiten.

Dan wordt een transplantaat geplaatst waarbij weefsel uit de omgeving verplaatst wordt naar het wondgebied.

## **Vorbereiding**

Het is van belang dat u uw plastisch chirurg vertelt of en zo ja, welke medicijnen u gebruikt. Als u bloedverdünnende middelen gebruikt, zoals Ascal/Aspirine/Plavix of acetylsalicylzuur moet u hier, afhankelijk van het medicijn dat u gebruikt zeven dagen voor de operatie mee stoppen om een bloeditstorting cq bloeding te voorkomen.

Neem eventueel contact op met de arts, die deze medicijnen heeft voorgeschreven, om na te gaan of het staken van deze medicijnen verantwoord is voor u.

Indien u bij de trombosedienst komt voor de dosering van uw bloedverdunners zoals acenocoumarol, marcoumar, neem dan contact op met de trombosedienst. Zij geven u een recept voor Vitamine K die u 30 uur voor de operatie dient in te nemen.

## **De operatie**

De huidaandoening wordt met een kleine hoeveelheid gezond weefsel verwijderd. Vervolgens wordt de huid gehecht. Indien mogelijk wordt dit met een oplosbare hechting onder de huid geplaatst. Anders wordt een hechting geplaatst die tijdens het volgende polikliniek bezoek wordt verwijderd.

De wond wordt verbonden met hechtpleisters of verband.

Het verwijderde weefsel wordt onderzocht door de patholoog- anatoom. Zo is er duidelijkheid over de aard van de aandoening en of het volledig verwijderd is.

## **Nazorg**

Over het algemeen zult u na de ingreep weinig tot geen pijn hebben. Als u pijn heeft mag u maximaal viermaal daags twee tabletten paracetamol van 500 milligram innemen.

Voordat u naar huis gaat geeft de polikliniekassistente of verpleegkundige instructies over het behandelen en verzorgen van de wond.

Indien u hechtpleisters heeft moeten deze tot het eerste polikliniek bezoek blijven zitten of zo lang de arts dit aangeeft. De hechtpleisters kunnen tegen water.

Wij adviseren u vervoer naar huis te regelen, want zelf autorijden is af te raden.

## **Gevolgen en risico's**

Zoals bij iedere operatie bestaat ook bij uw behandeling een klein risico op complicaties. Dit kan een nabloeding, bloeduitstorting, wondinfectie of ander probleem met de wondgenezing zijn.

Mensen die roken lopen meer kans op complicaties. Het is daarom van belang om (tijdelijk) te stoppen met roken vanaf enkele weken voor de operatie tot drie weken na de operatie.

## Nabehandeling

Na de operatie komt u terug voor wondcontrole op de polikliniek plastische chirurgie. De niet-oplosbare hechtingen worden tijdens het bezoek verwijderd. Ook krijgt u de uitslag van de patholoog anatoom.

Wanneer u tijdens de herstelperiode last krijgt van abnormale pijn, een ernstige zwelling, roodheid of koorts, wordt u verzocht contact op te nemen met de polikliniek plastische chirurgie via telefoonnummer (0318) 43 52 70.

Binnen 24 uur na de behandeling kunt u buiten kantoortijden bellen met de dienstdoende arts van de spoedeisende hulp, (0318) 43 58 05.

Vanaf 24 uur na de behandeling kunt u buiten kantoortijden contact opnemen met de huisartsenpost, (0318) 43 44 44.

De behandeling vindt plaats in:

- Ziekenhuis Gelderse Vallei te Ede, dagbehandeling; u ontvangt hiervoor schriftelijk een afspraak
- Ziekenhuis Gelderse Vallei te Ede, polikliniek plastische chirurgie; vleugel B, 1e verdieping, bestemming 110.

Datum:.....

Tijd behandeling:.....

Het kan voorkomen dat de arts die u tijdens het spreekuur op de polikliniek heeft gezien, niet de arts is die de operatie uitvoert.

## Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, neem dan gerust contact op met de polikliniek plastische chirurgie. U kunt ons bereiken tussen 08.30 -17.00 uur via het telefoonnummer, (0318) 43 52 70.