



Medicijnen tegen tuberculose

Tuberculose (TBC) is een infectieziekte die wordt veroorzaakt door de tuberkelbacterie. In Nederland komt TBC weinig voor. In veel andere gebieden, zoals in Azië, Afrika, Oost-Europa en Zuid Amerika komt een besmetting wel vaak voor. Niet iedereen die besmet is met deze tuberkelbacterie wordt ook daadwerkelijk ziek.

Sommige mensen hebben, als ze besmet zijn geraakt, alsnog een grotere kans om op een later moment ziek te worden. Dit geldt ook voor mensen die na een transplantatie afweeronderdrukkende medicijnen moeten gebruiken.

Als de kans bestaat dat u TBC bij u draagt, wordt u voordat u een eventuele niertransplantatie ondergaat preventief behandeld. Zie info 3.51 'Voorbereiding op niertransplantatie'.

Gedurende 4 maanden krijgt u rifampicine en isoniazide. Als u te veel bijwerkingen heeft van de rifampicine, dan is 9 maanden alleen isoniazide een alternatief.

Indicatie

TBC of preventie van TBC.

Voorschrift

- Rifampicine (Rifadin®).
- Isoniazide.
- Isoniazide/rifampicine (Rifinah®).



Rifampicine (Rifadin®)

Innameadvies

Capsule of tablet geheel innemen op een lege maag (1 uur vóór of 2 uur na de maaltijd). Heeft u veel maagdarmlachten overleg dan met de nefroloog of u het direct na de maaltijd in kunt nemen.

Bijwerkingen

- Zelden maagdarmlachten (maagpijn (innemen na de maaltijd vermindert de klachten), misselijkheid, braken, buikpijn en diarree). Jeuk (met of zonder huiduitslag), galbulten. Sufheid, duizeligheid, vermoeidheid en hoofdpijn. Bruine of oranje verkleuring van lichaamsvloeistoffen (zoals urine, ontlasting, speeksel, oogvocht en zweet).

Isoniazide

Innameadvies

Drank of tablet bij voorkeur innemen 1 uur vóór het ontbijt. Of innemen 2 uur na de maaltijd.

Isoniazide wordt verwijderd bij hemodialyse en peritoneale dialyse. In dat geval bij hemodialyse innemen na de dialyse-behandeling. Bij peritoneale dialyse overleg met nefroloog.

Bijwerkingen

- Zelden zenuwbeschadiging (tintelingen of doof gevoel in armen en benen, concentratiestoornissen, vermoeidheid en slechter zien). Hoofdpijn, opvlieger, blozen, jeuk, maagdarmlachten (maagpijn (innemen na het ontbijt vermindert de klachten), misselijkheid, buikpijn en diarree).



Isoniazide/rifampicine (Rifinah®)

Innameadvies

Dragee geheel innemen bij voorkeur 1 uur vóór het ontbijt. Of innemen 2 uur na de maaltijd. Heeft u veel maagdarmklachten overleg dan met de nefroloog of u het direct na de maaltijd in kunt nemen. Isoniazide wordt verwijderd bij hemodialyse en peritoneale dialyse. In dat geval bij hemodialyse innemen na de dialyse-behandeling. Bij peritoneale dialyse overleg met nefroloog.

Bijwerkingen

Zie de bijwerkingen bij rifampicine en isoniazide.

Pyridoxine (vit. B6)

Een bijwerking van isoniazide is een zenuwbeschadiging. Pyridoxine (vitamine B6) kan veel bijwerking voorkomen. Daarom wordt de behandeling aangevuld met pyridoxine.

Indicatie

Gebruik van isoniazide.

Innameadvies

Tablet 1x daags innemen.

Bijwerkingen

- Zeer zelden overgevoeligheid (jeuk, huiduitslag en tintelingen in vingers en tenen).