

**Vedolizumab (Entyvio®)**  
bij de ziekte van Crohn en colitis  
ulcerosa

**Uw behandelend arts heeft met u gesproken over het gebruik van Vedolizumab (Entyvio®). In deze folder krijgt u informatie over de werking en het gebruik van dit medicijn en hoe u moet handelen in geval van bijwerkingen. Deze folder is echter géén vervanging van de bijsluiter. Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u daarmee bij uw behandelend arts of verpleegkundige terecht.**

## **Algemeen**

Entyvio® bevat het werkzame bestanddeel Vedolizumab. Het is een geneesmiddel dat selectief in de darmen werkt, zonder hierbij uw gehele afweersysteem te onderdrukken. Het wordt gebruikt bij volwassenen met een matig tot ernstig actieve colitis ulcerosa en de ziekte van Crohn. U krijgt dit geneesmiddel omdat andere behandelingen, zoals steroïden, immunosuppressiva of biologicals, niet of onvoldoende hebben gewerkt.

## **Voorzorgsmaatregelen**

Voordat u start met Vedolizumab is het van belang om sluimerende of actieve infecties uit te sluiten of te behandelen. Voordat u start met de behandeling (als dit nog niet gedaan is omdat dit al nodig was voor andere medicatie) wordt u gecontroleerd op tuberculose (TBC) en hepatitis B besmetting.

## **Werking**

Vedolizumab is een monokonaal antilichaam. Dit betekent dat het middel gemaakt is om zich te binden aan een bepaalde cel of bepaald eiwit. In dit geval aan een eiwit dat alleen op witte bloedcellen wordt aangetroffen. Wanneer Vedolizumab aan dit eiwit bindt, voorkomt het dat de witte bloedcel reageert met andere cellen in uw darmen. Dit helpt te voorkomen dat de witte bloedcellen een ontsteking veroorzaken, wat de voornaamste oorzaak is van symptomen bij colitis ulcerosa en de ziekte van Crohn. Doel is de ziekte tot staan te brengen (in remissie), symptomen en klachten van uw ziekte te verminderen en ervoor te zorgen dat u niet steeds steroïden nodig heeft.

## **Toediening**

Vedolizumab wordt in het ziekenhuis via een infuus toegediend op de dagbehandeling. Dit duurt ongeveer 30 minuten. U start met een behandeling van 6 weken waarin u 3 Vedolizumab infusies krijgt toegediend. Na het eerste infuus, ontvangt u opnieuw een infuus na 2 en 6 weken. Als de behandeling goed aanslaat krijgt u iedere 8 weken opnieuw een infusie. De eerste 2 keer dat u dit geneesmiddel krijgt wordt u 2 uur op de dagbehandeling onder toezicht gehouden. Als u het middel goed verdraagt kan u bij de volgende infusies na een uur naar huis.

Belangrijk is dat u klachten tijdens of na de infusie dadelijk aangeeft bij uw verpleegkundige. Merkt u thuis klachten kan u contact opnemen met de MDL verpleegkundige.

Een groot aantal patiënten bij wie de behandeling aanslaat, merken verbetering binnen 6 weken. Als u de ziekte van Crohn heeft en u heeft na 6 weken geen verbetering van de klachten gemerkt kan de arts besluiten om na tien weken een extra dosis toe te dienen.

Als u colitis ulcerosa of de ziekte van Crohn heeft en u merkt dat de Vedolizumab minder lijkt te werken kan de arts besluiten dat u het geneesmiddel eens in de 4 weken toegediend gaat krijgen.

## **Belangrijk**

Belangrijk is dat u het volgende meldt aan uw arts of MDL-verpleegkundige *voordat* u een Vedolizumab infusie krijgt:

- Als u een infectie heeft, denkt dat u mogelijk een infectie heeft, of infecties heeft die steeds terug komen
- Als u leverproblemen heeft
- Als u tuberculose (TBC) heeft of contact hebt gehad met iemand met TBC
- Als u onlangs gevaccineerd bent of als er een vaccinatie gepland is
- Als u zwanger bent of een kinderwens heeft. Het is onbekend of Vedolizumab schadelijk is voor uw ongeboren baby. Als u zwanger bent meldt dit dan onmiddellijk aan uw arts of MDL verpleegkundige
- Als u borstvoeding geeft. Het is onbekend of Vedolizumab in de moedermelk terecht komt
- Als u last heeft of krijgt van wazig zien, verlies van gezichtsvermogen of dubbel zien, problemen met praten, zwakte in een arm of been, een verandering in de manier waarop u loopt of problemen heeft met uw evenwicht, aanhoudend doof gevoel, verminderd gevoel of verlies van gevoel, geheugenverlies of verwardheid

Het is belangrijk om uw arts te informeren over alle geneesmiddelen die u gebruikt. Ook de vrij verkrijgbare geneesmiddelen, de vitamines of kruidensupplementen.

## **Bijwerkingen**

Uw MDL arts zal met u bespreken of de behandeling geschikt voor u is. De veiligheid en werkzaamheid van Vedolizumab zijn onderzocht bij patiënten met een matig tot ernstig actieve colitis ulcerosa en de ziekte van Crohn. Uit deze onderzoeken kwam dat de kans op infecties nauwelijks verhoogd is. Ook tijdens het toedienen van het geneesmiddel via het infuus was het aantal reacties laag. Zoals alle geneesmiddelen kan Vedolizumab ongewenste reacties of bijwerkingen veroorzaken, niet alle patiënten zullen hier last van krijgen.

De meest voorkomende bijwerkingen zijn verkoudheid, hoofdpijn en gewrichtspijn. Tot de mogelijk ernstige bijwerkingen van de behandeling met Vedolizumab behoren reacties op de infusie zelf of allergische reacties en infecties.

Meldt het dadelijk aan uw MDL-arts of MDL-verpleegkundige als u de volgende symptomen opmerkt: piepende ademhaling of problemen bij het ademen, galbulten, jeukende huid, zwelling, snelle hartslag, misselijkheid, pijn op de infusieplaats, roodheid van de huid, (koude) rillingen, hoge koorts of huiduitslag.

Wanneer u Vedolizumab krijgt voorgeschreven, krijgt u ook een kaartje voor in uw portefeuille. Door dit kaartje worden u en uw arts gewezen op belangrijke veiligheidsinformatie tot het gebruik van Vedolizumab. Het is belangrijk dat u altijd doorgeeft aan uw MDL-arts of MDL-verpleegkundige als u denkt dat u mogelijk bijwerkingen heeft terwijl u Vedolizumab gebruikt.

## **Tot slot**

Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, neem dan contact op met uw behandelend arts of de MDL verpleegkundige. De MDL verpleegkundige heeft telefonisch spreekuur op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 11.00 tot 11.30 uur, (0318) 43 57 73.

De polikliniek maag-, darm-, leverziekten is op werkdagen van 08.30 – 17.00 uur bereikbaar via (0318) 43 43 45.

