

Aurothiomalaat
(goudinjecties)
Tauredon®

Het doel van deze folder is u praktische informatie te geven over het nieuwe medicijn dat u gaat gebruiken: aurothiomalaat.

Hoe werkt aurothiomalaat?

Bij patiënten met een reumatische auto-immuunziekte is er een fout in het afweersysteem ontstaan waardoor er sprake is van een afweerreactie tegen het eigen lichaam. Dit kan in verschillende plaatsen van het lichaam gebeuren. Bij reumatische ziekten zijn dit vaak de gewrichten.

Aurothiomalaat is een medicijn dat deze afweerreactie onderdrukt. Het precieze werkingsmechanisme is (nog) onbekend. Gebruik van dit medicijn leidt tot een afname van pijn, zwelling en stijfheid van de gewrichten waardoor op de langere termijn de kans op gewrichtsschade afneemt. De werking van aurothiomalaat treedt op na enkele maanden. Soms duurt het echter langer en bij sommige mensen werkt het medicijn helaas niet of onvoldoende.

Voor welke aandoeningen wordt het gebruikt?

Aurothiomalaat wordt gebruikt bij de behandeling van patiënten met reumatoïde artritis en soms bij juveniele idiopathische artritis (jeugdreuma).

Hoe moet ik het gebruiken?

Aurothiomalaat wordt toegediend als injectie in de bilspier. Dit wordt gedaan door de doktersassistente op de polikliniek reumatologie, bij de huisarts of door een andere zorgverlener. Voordat u start met de behandeling krijgt u een proefinjectie met een lage dosering van 10 mg. Dit wordt gedaan om te beoordelen of u allergisch reageert op aurothiomalaat. Als u dat goed verdraagt, start u een week later met wekelijkse injecties van 50 mg. Als uw ziekte rustig is, kan in overleg met uw behandelaar worden besloten om de dosering te verlagen en de aurothiomalaat eventueel zelfs te stoppen.

Hoe moet ik het bewaren?

Aurothiomalaat moet u zelf thuis in het donker bewaren bij een temperatuur onder de 25°Celsius. Na optrekken in de spuit moet het direct worden toegediend.

Wat zijn mogelijke bijwerkingen?

In de bijsluiters van het medicijn vindt u een uitgebreid overzicht van alle bijwerkingen die kunnen voorkomen. Hieronder vindt u belangrijke bijwerkingen om van op de hoogte te zijn. Bijwerkingen treden vooral op tussen de derde en achtste maand van gebruik:

- huiduitslag en jeuk
- ontstoken mondslijmvlies
- grijsblauwe verkleuring van de huid, met name in de aan zonlicht blootgestelde huid

- bijwerkingen die u zelf niet merkt maar die uw behandelaar met bloedonderzoek controleert zijn leverfunctieafwijkingen, nierfunctie stoornis met eiwitverlies in de urine en verlaagde bloedcellen
- reacties direct na de injectie zoals duizeligheid, roodheid in het gezicht, hoofdpijn en een lage bloeddruk
- allergieën en overgevoelighedsreacties kunnen voorkomen. Bij nieuwe huidafwijkingen, koorts of benauwdheidsklachten adviseren we u zo spoedig mogelijk contact op te nemen met uw huisarts en/of behandelaar

Zijn er controles noodzakelijk tijdens het gebruik?

Vóór en na het starten van aurothiomalaat zal uw behandelaar met u laboratoriumcontroles (bloedprikken) en urine-onderzoek afspreken. Dit zal in het begin regelmatig nodig zijn om in de gaten te houden hoe uw lichaam op het medicijn reageert. Bij verandering van de dosering of afwijkende bevindingen zult u mogelijk extra gecontroleerd worden.

Kan ik het gebruiken met andere medicijnen?

Aurothiomalaat wordt bij patiënten met reumatoïde artritis soms gecombineerd met een andere anti-reumatisch middelen. Medicijnen die u gebruikt voor andere aandoeningen kunnen vrijwel altijd zonder problemen met aurothiomalaat samen gebruikt worden. Gelijktijdig gebruik met malariamiddelen kunnen huiduitslag geven. Probeer lichtgevoelige medicijnen zoals fenylbutazon of chloorpromazine te vermijden. Meld altijd bij uw behandelaars dat u aurothiomalaat gebruikt. Overleg met uw behandelaar wanneer er een verandering in uw medicatie gebruik is opgetreden.

Wat moet ik nog meer weten?

Alcohol

Er is geen bezwaar tegen (matig) alcohol gebruik tijdens behandeling met aurothiomalaat.

Autorijden

Aurothiomalaat veroorzaakt geen sufheid of slaperigheid. Er is geen bezwaar tegen autorijden tijdens het gebruik van aurothiomalaat.

Operaties en andere (tandheelkundige) ingrepen

Er zijn geen bezwaren tegen operaties of andere (tandheekundige) ingrepen tijdens gebruik van aurothiomalaat.

Reizen

Bij reizen naar het buitenland is het raadzaam een actueel overzicht van uw medicijnen mee te nemen, het medicatie paspoort. Dit is verkrijgbaar bij uw apotheek of eventueel bij uw behandelaar.

Vaccinaties

Gezien het feit dat u een reumatische ziekte heeft en reuma medicijnen gebruikt, adviseren wij u om u jaarlijks tegen de griep (influenza) te laten vaccineren door uw huisarts.

Heeft u een vaccinatie nodig, overleg dan altijd van tevoren met uw reumatoloog, apotheek of huisarts.

Vruchtbaarheid, zwanger worden en borstvoeding

Van dit medicijn is niet bekend of het de vruchtbaarheid beïnvloedt. Indien u plannen heeft om in de nabije toekomst zwanger te worden of onverwacht zwanger bent, adviseren wij u daarom dit kenbaar maken aan uw behandelaar.

Aurothiomalaat is namelijk schadelijk voor het ongeboren kind.

Vrouwen krijgen het advies om tijdens de behandeling met aurothiomalaat voor een betrouwbare anticonceptie te zorgen, en deze na staken van de aurothiomalaat ten minste één jaar voort te zetten.

Aurothiomalaat mag niet worden gebruikt tijdens borstvoeding.

Vragen

Wanneer u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft, zal uw behandelend reumatoloog deze graag beantwoorden.

Polikliniek reumatologie:

dr. E.A.J. Dutmer

dr. M.J. Rood

dr. J.N. Stolk

Telefoonnummer (0318) 43 43 43 / 43 53 00