

# Brandwonden

## **U bent bij ons behandeld wegens brandwonden. Het is belangrijk om op de volgende punten te letten.**

Het verbonden lichaamsdeel moet rust krijgen, voor een arm krijgt u een draagdoek, een been moet worden hoog gelegd. het verband moet droog en schoon gehouden worden en mag niet verwijderd worden. De eerste dagen kunt u het beste extra drinken, bijvoorbeeld melk of karnemelk.

Neem in onderstaande gevallen contact met ons op:

- als u de derde dag nog koorts heeft, 38,5 C of hoger
- verband gaat stinken
- als de pijnklachten verergeren.

Als normaal kunt u beschouwen:

- koorts tijdens de eerste dagen tot 39 graden
- doorlekken van het verband
- afnemende pijnklachten.

### **Pijnbestrijding**

Bij pijnklachten kunt u Paracetamol gebruiken. Gebruik maximaal 4 keer per dag 2 tabletten van 500 mg (maximaal 8 tabletten per dag = 4000 mg).

Pijnbestrijding bij kinderen: kijk in de bijsluiters voor de juiste dosering. Gebruikt u antibiotica, maak dan altijd de hele kuur af.

### **Vragen**

Voor vragen kunt u van maandag t/m vrijdag van 08.30 - 17.00 (0318) 43 52 00 bellen met polikliniek chirurgie. Buiten deze tijden met de spoedeisende hulp (0318) 43 58 05.

Wij wensen u van harte beterschap.