









Inschatting risico op ondervoeding en start dieetbehandeling

Stap	Actie	Wie?
 1. Risico inschatting	Beoordeel de situatie: <ul style="list-style-type: none"> Hoe is de globale intake? Zijn er belemmeringen voor gebruik adequate voeding (denk aan b.v. gebitsklachten, slik- en passageklachten, pijn, medicatie, eenzaamheid, financiële problemen). Bepaal risico op ondervoeding middels een screeningsinstrument.	Verantwoordelijke: <ul style="list-style-type: none"> Huisarts Praktijkondersteuner Wijkverpleegkundige
 2. Verwijzing	Bij risico op ondervoeding: <ul style="list-style-type: none"> Verwijs naar de diëtist. 	Verantwoordelijke: <ul style="list-style-type: none"> Huisarts
 3. Diagnose	Verricht diagnostiek met betrekking tot de voedingstoestand.	Verantwoordelijke: <ul style="list-style-type: none"> Diëtist
 4. Behandelplan	Maak uitvoeringsafspraken met patiënt: <ul style="list-style-type: none"> Stel behandeldoelen op voor korte en lange termijn Behandelrichtlijn ondervoeding volwassenen Behandelrichtlijn ondervoeding kinderen 	Verantwoordelijke: <ul style="list-style-type: none"> Diëtist
 5. Samenwerking	<ul style="list-style-type: none"> Rapporteer aan huisarts en andere betrokken zorgverleners. Maak multidisciplinaire afspraken over doelen, vervolgcacties en evaluatie. 	Verantwoordelijke: <ul style="list-style-type: none"> Diëtist
 6. Evaluatie	Evalueer intake en gewichtsverloop. Wordt het doel niet behaald? <ul style="list-style-type: none"> Overweeg inzet medische voeding (drinkvoeding, modules). 	Verantwoordelijke: <ul style="list-style-type: none"> Diëtist
 7. Bij start drinkvoeding	Bepaal de categorie drinkvoeding / module o.b.v. de productkenmerken, eigen intake, voedingsbehoefte, medische diagnose en eventuele voedselallergie/-intolerantie. Bepaal of de indicatie voor drinkvoeding / module voor vergoeding in aanmerking komt. Indien ja: <ul style="list-style-type: none"> Vul de verklaring dieetpreparaten in. Bestel drinkvoeding via facilitair bedrijf of apotheek. Maak afspraken met de patiënt over: <ul style="list-style-type: none"> Vervolgbestelling (met facilitaire bedrijven kan een automatische levering worden afgesproken). Wie actie moet ondernemen bij verlopen van de machtiging. 	Verantwoordelijke: <ul style="list-style-type: none"> Diëtist
 8. Evaluatie	Evalueer intake en gewichtsverloop: <ul style="list-style-type: none"> Doel behaald: <ul style="list-style-type: none"> Maak afspraak over afbouw drinkvoeding. Eindrapportage aan huisarts. Doel niet behaald: <ul style="list-style-type: none"> Overweeg inzet sondevoeding. Bespreek dit multidisciplinair. Betrek hierbij de medische diagnose en de mogelijkheden thuis. Zie schema "start sondevoeding in de eerste lijn". 	Verantwoordelijke: <ul style="list-style-type: none"> Diëtist Huisarts en evt. Wijkverpleegkundige