

# Cryocoagulatie

**In overleg met uw arts heeft u besloten dat u in verband met uw pijnklachten een cryolaesiebehandeling zult ondergaan. Bij deze behandeling wordt door middel van bevriezing de pijngeleiding van een zenuw uitgeschakeld. Door middel van bevriezing is het mogelijk om bepaalde vormen van pijn te behandelen. Meestal gaat het om bepaalde vormen van zenuwpijn of littekenpijn.**

### **Algemene informatie**

De behandeling vindt poliklinisch plaats. De assistente van het Pijncentrum haalt op uit de wachtkamer. Zij neemt u mee naar de behandelkamer waar u de behandeling krijgt. Na de behandeling mag u direct weer naar huis, tenzij uw behandelend arts het raadzaam vindt dat u nog even bij de verpleegkundige op de herstelkamer van ons behandelcentrum plaats neemt.

### **Behandeling**

Voordat de behandeling plaatsvindt, wordt de huid door middel van een injectie verdoofd. Vervolgens wordt er een sneetje van enkele millimeters in de huid gemaakt, waardoor de cryonaald wordt ingebracht. Dit is een holle naald, waardoor vloeibaar koolzuur wordt geleid. De tip van deze naald wordt ijskoud, waardoor de zenuw bevroest. Wanneer de naaldpunt op de juiste plaats zit, begint de behandeling. De behandeling duurt ongeveer 15 minuten.

### **Complicaties**

Complicaties zijn zeldzaam en de arts voert de behandeling te allen tijde zorgvuldig uit. Toch bestaat er een kleine kans op een aantal complicaties:

- er kan een bloeding ontstaan op de plaats waar u behandeld bent, waarvoor geen behandeling nodig is
- door de temperatuursverlaging kan er een blaas op de huid ontstaan. Deze blaas geneest vanzelf, tenzij er een infectie ontstaat. Mocht dit gebeuren dan kunt u contact opnemen met het Pijncentrum Gelderse Vallei
- bij het bevriezen van een bepaalde zenuw ter hoogte van de borstkas of ribben kan het longvlies worden geraakt. Hierdoor kan een klaplong ontstaan. Het risico hierop is zeer klein. U ervaart dan klachten van benauwdheid. Wanneer dit gebeurt moet u naar het ziekenhuis komen om een longfoto te laten maken. Als uit de longfoto blijkt dat het longvlies is aangeprikt, wordt u enkele dagen opgenomen voor behandeling van een klaplong

## **Bijwerkingen**

U kunt na de behandeling last krijgen van napijn. Deze napijn kan enkele weken aanhouden, maar verdwijnt altijd weer. Als u hier veel last van heeft, kunt u hiervoor een pijnstiller innemen, bijvoorbeeld Paracetamol.

## **Resultaat**

Pas na enkele weken is het zinvol om het resultaat van de behandeling te beoordelen. Het is mogelijk dat u eerder merkt dat u minder pijn heeft. In een aantal gevallen is een herhaling of aanvullende behandeling nodig.

### **Attentie**

- Informeer uw arts over een eventuele allergie voor jodium, contrastmiddel of medicijnen.
- Als u antistollingsmiddelen / bloedverduunners gebruikt waarvoor controle bij de trombosedienst nodig is (Acenocoumarol/Sintrom of Fenprocoumon/Marcoumar), bespreek dit dan met uw arts. Over het algemeen mag u deze medicijnen door blijven gebruiken en krijgt u een recept voor vitamine K tablet/drank mee naar huis. Neem deze tablet/drank 36 - 48 uur voor de behandeling in. Het is belangrijk dat u op de dag van de behandeling eerst bloed laat prikken bij het laboratorium van Ziekenhuis Gelderse Vallei.
- Gebruikt u antistollingsmiddelen / bloedverduunners waarvoor geen controle nodig is bij de trombosedienst, bespreek dan met uw arts of u met deze medicijnen moet stoppen of kunt doorgaan.
- Na de behandeling mag u dezelfde dag niet zelfstandig aan het verkeer deelnemen.

*Indien u op de dag van de behandeling koorts heeft, verzoeken wij u om telefonisch contact op te nemen met uw behandelend arts.*

## **Vragen**

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Stel deze gerust aan de assistente van het Pijncentrum. Neem tussen 08.30 - 16.30 uur contact op met Pijncentrum Gelderse Vallei (0318) 43 58 70.

Zijn er binnen 24 uur na de behandeling problemen en valt dit buiten kantoor tijden? Neem dan contact op met de afdeling spoedeisende hulp (0318) 43 58 05.