

Meropenem (Meronem)

Afleveringsvorm: Injectieflacon met 1 gram meropenem (als trihydraat).

Oplosmiddel: Water voor injecties (aqua destillata).

Klaarmaken: Intraveneus:
1 gram oplossen in 20 ml water voor injecties.

Toediening i.v. a. Rechtstreeks: langzaam, in 3-5 minuten toedienen.
b. Verdund als infuus: voeg de ampulinhoud toe aan 50-100 ml NaCl 0,9% en laat in ca. 15-30 minuten inlopen.

N.B: Bij hypernatriëmie kan de ampulinhoud ook worden toegevoegd aan 100 ml glucose 5%.

Kortlopend infuus: 1 ampul van 500mg oplossen in 10 ml water voor injecties
Toevoegen aan 100 ml NaCl 0,9%
Inlopen in 15-30 minuten
Naspoelen met 50 ml NaCl 0,9%

Bolus: 1 ampul van 500 mg oplossen in 10 ml water voor injecties
Toedienen in 3-5 minuten
Voor en na flushen met 5 ml NaCl 0,9%

Wet B.I.G. Een directe intraveneuze bolusinjectie van dit middel is een handeling toegestaan aan een verpleegkundige.

Kans op flebitis Na verdunning met 50-100 ml NaCl 0,9% is de osmolaliteit vrijwel gelijk die van serum, zodat de kans op pijn of flebitis niet groot is.

Houdbaarheid De oplossing in de injectieflacon is in de koelkast 24 uur houdbaar.
Na verdunning in infuus of spuitpomp moet de oplossing binnen 24 uur gebruikt zijn.

Onverenigbaarheden Meropenem is met een aantal geneesmiddelen onverenigbaar.
Raadpleeg eventueel een apotheker.

Hulpstoffen natriumcarbonaat