

# Zwangerschap en groep-B- streptokokken

## Inhoud

Inleiding	3
Wat zijn Groep-B-streptokokken?	3
Hoe vaak komen Groep-B-streptokokken voor bij zwangeren?	3
De gevolgen van GBS voor pasgeboren baby's	3
Hoe kan een kind besmet en ziek (geïnficeerd) worden?	4
In de baarmoeder	4
Tijdens de bevalling	4
Na de geboorte	4
GBS-ziekte bij het kind	5
Welke baby's hebben een verhoogde kans om ziek te worden door een infectie met GBS?	5
Onderzoek naar GBS tijdens de zwangerschap	5
Kan een GBS-infectie voorkomen worden?	6
Vragen	6
Meer informatie	6

**De 'groep-B-streptokok' is een bacterie die bij veel zwangere vrouwen in de vagina (schede) aanwezig is. Meestal kan deze bacterie geen kwaad voor de zwangere en haar kind, maar in een enkel geval wordt de baby ernstig ziek door een infectie met deze bacterie.**

Deze folder geeft informatie over deze groep-B-streptokokkenziekte.

### **Wat zijn Groep-B-streptokokken?**

Streptokokken zijn bacteriën. Ze zijn alleen zichtbaar onder de microscoop. Er bestaan verschillende soorten streptokokken en groep-B-streptokokken is er een van. Ze worden in deze folder afgekort als 'GBS'.

### **Hoe vaak komen Groep-B-streptokokken voor bij zwangeren?**

GBS komen bij één op de vijf volwassenen voor zonder dat er klachten zijn. Eén op de vijf zwangeren draagt deze bacteriën bij zich; zij worden dragers genoemd. De GBS bevinden zich samen met andere bacteriën in de darmen. Vaak zijn ze ook in de baarmoedermond of vagina te vinden zonder dat er klachten zijn. Soms veroorzaken ze een blaasontsteking. Ze zijn dan in een kweek van de urine te vinden.

### **De gevolgen van GBS voor pasgeboren baby's**

Ongeveer de helft van de vrouwen die de streptokokken bij zich dragen, geeft deze tijdens de bevalling door aan het kind. We weten dat één op de vijf zwangere vrouwen (20%) draagster is. Dit heeft tot gevolg dat 10% van alle pasgeboren baby's met GBS besmet wordt. De bacteriën zijn dan alleen op de huid of slijmvliezen van het kind aanwezig, en de baby wordt er niet ziek van. Van alle pasgeborenen wordt ongeveer één op de duizend ziek door een infectie met GBS. De bacteriën dringen dan het lichaam binnen. Het kind kan dan zeer ernstig ziek zijn. Kinderen van moeders die GBS-draagster zijn, worden in één op de honderd gevallen ziek. Deze ziekte kan meestal goed behandeld worden met een antibioticum.

## **Hoe kan een kind besmet en ziek (geïnficeerd) worden?**

Als een zwangere vrouw GBS bij haar draagt, kan het kind al in de baarmoeder besmet worden. Dit kan ook tijdens de bevalling of na de geboorte gebeuren. Hieronder bespreken we hoe besmetting en infectie met GBS plaatsvindt, en welke verschijnselen kunnen optreden.

### *In de baarmoeder*

Als een kind al in de baarmoeder besmet wordt met GBS, gebeurt dat meestal na het breken van de vliezen. De streptokokken komen vanuit de vagina via de baarmoedermond de baarmoeder in en bereiken zo het ongeboren kind. Het kind drinkt vruchtwater en heeft ook vruchtwater in de longen. Zo kan de baby al voor de geboorte worden besmet en ziek worden. Deze kans is groter naarmate de vliezen langer gebroken zijn. In uitzonderingssituaties vindt besmetting en infectie in de baarmoeder plaats zonder dat de vliezen gebroken zijn. Temperatuurverhoging van de moeder en een snelle hartslag van de baby zijn aanwijzingen voor een infectie.

### *Tijdens de bevalling*

Als GBS in de vagina (schede) aanwezig zijn, wordt ongeveer de helft van de kinderen tijdens de bevalling besmet. Gewoonlijk veroorzaken de streptokokken dan geen ziekteverschijnselen. Ze blijven alleen op de huid en de slijmvliezen van de baby aanwezig. In een enkel geval, ongeveer 1%, wordt de baby wel ziek, meestal al vrij snel na de geboorte.

### *Na de geboorte*

In minder dan een derde van de gevallen wordt de baby pas na de eerste levensweek ziek. Dit wordt een 'late-onset'-infectie genoemd: een GBS-ziekte die laat ontstaat. Zo kunnen kinderen nog in de eerste drie levensmaanden ziek worden. Soms zijn ze dan al tijdens de geboorte besmet, maar ontstaat ziekte door de GBS-bacterie pas later. In andere gevallen wordt het kind na de geboorte besmet, bijvoorbeeld via de handen van een volwassene. Ook als een kind pas later ziek wordt als gevolg van GBS is het ziekteverloop vaak zeer ernstig.

## **GBS-ziekte bij het kind**

Als een pasgeborene ziek wordt als gevolg van een infectie met groep-B-streptokokken, is dat in negen van de tien gevallen op de eerste dag. Vaak ademt het kind snel en oppervlakkig. Soms houdt het ademen even op. De kleur van de huid is niet mooi roze, maar grauw, blauw of bleek. Het kind kan slap aanvoelen en suf zijn. Soms is de baby overprikkelbaar en treden er stuipen op.

Vaak is een zacht kreunend geluid bij het uitademen het eerste verschijnsel van ziekte. Dit kreunen is een belangrijk waarschuwingssignaal, maar ook een snelle ademhaling of een afwijkende kleur kunnen de aandacht trekken. Voedingsproblemen zoals spugen of niet willen drinken, koorts of juist ondertemperatuur zijn soms ook een teken van GBS-ziekte.

Het ernstig ziek zijn is een gevolg van ontstekingen, zoals een longontsteking (pneumonie), een bloedinfectie (sepsis) of een hersenvliesontsteking (meningitis). Soms komen verschillende ontstekingen tegelijkertijd voor. Een hersenvliesontsteking wordt vaker gezien bij kinderen die wat later na de geboorte ziek worden. Ziekteverschijnselen kunnen zich in heel snel tempo ontwikkelen, soms binnen enkele uren. Daarom kan medische hulp te laat komen. Soms is het ziekteverloop ook zo snel en ernstig dat zelfs een snel begonnen behandeling met een antibioticum een slechte afloop niet kan voorkomen.

## **Welke baby's hebben een verhoogde kans om ziek te worden door een infectie met GBS?**

Een GBS-infectie komt nogal eens uit de lucht vallen. Tijdens de zwangerschap of de bevalling waren er geen aanwijzingen voor een verhoogde kans op deze ziekte. In een aantal gevallen weten we dat de baby wel een verhoogde kans loopt op ziekte door een GBS-infectie:

- een vroeggeboorte (zwangerschapsduur minder dan 37 weken)
- langdurig gebroken vliezen (langer dan 18 uur)
- temperatuursverhoging van de moeder tijdens de bevalling (hoger dan 37,8-38,0 graden Celsius)
- een blaasontsteking door GBS bij de moeder tijdens de zwangerschap
- een eerder kind met GBS ziekte

## **Onderzoek naar GBS tijdens de zwangerschap**

GBS wordt bij één op de vijf zwangeren gevonden en heeft maar zeer zelden gevolgen. Soms is het wel verstandig onderzoek te doen, zoals bij een zwangere die in het ziekenhuis opgenomen is in verband met voortijdige weeën of te vroeg gebroken vliezen. De streptokokken kunnen dan worden aangetoond met behulp van een kweek. De verpleegkundige strijkt dan met een wattenstokje langs de ingang van de schede. Het duurt twee tot drie

dagen voordat de uitslag bekend is.

### **Kan een GBS-infectie voorkomen worden?**

Het is lang niet altijd mogelijk een GBS-ziekte van de baby te voorkomen. In situaties waar het kind een hoge kans heeft om ziek te worden, kan de arts wel voorzorgsmaatregelen nemen. Soms wordt er al tijdens de bevalling een antibioticum gegeven. Redenen daarvoor kunnen zijn: koorts tijdens de bevalling, een eerder kind dat GBS- ziekte heeft gehad, of een blaasontsteking met GBS tijdens de zwangerschap. In deze gevallen weten we dat de zwangere heel veel GBS bij zich draagt. Een uitslag van een kweek die GBS laat zien bij een dreigende vroeggeboorte of voortijdige gebroken vliezen is een andere reden om al tijdens de bevalling een antibioticum te geven.

Soms krijgt ook de baby na de geboorte nog antibiotica van de kinderarts, bijvoorbeeld bij koorts tijdens de bevalling. In andere gevallen wordt geadviseerd de baby de eerste 48 uur extra in de gaten te houden. Dit doen we door de baby tot 48 uur na de bevalling in het ziekenhuis op de kraamafdeling te observeren aan de hand van een observatielijst. De verpleegkundige bekijkt bij uw baby de hartslag, ademhaling, temperatuur , kleur en algemene conditie. U blijft uiteraard ook opgenomen.

Als uw baby ziek wordt krijgt hij/zij gedurende een week een infuusje met antibiotica op de couveuseafdeling. Het gebeurt maar zelden dat de moeder na de bevalling een antibioticum nodig heeft.

Een enkele keer worden al vóór de zwangerschap bij een vrouw streptokokken van een groep B aangetoond, bijvoorbeeld in een kweek die gemaakt wordt omdat de vrouw afscheiding heeft. Dit heeft geen gevolgen voor de bevalling, zolang er tenminste geen andere risicofactoren zijn, zoals vroeggeboorte, koorts tijdens de bevalling of vliezen die langdurig gebroken zijn.

### **Vragen**

In deze folder worden de gevolgen van de Groep-B-streptokokken beschreven. Mocht u naar aanleiding van deze folder nog vragen hebben, aarzel dan niet ze met de gynaecoloog, verloskundige, huisarts of verpleegkundige te bespreken.

### **Meer informatie**

Als u behoefte heeft aan meer informatie over GBS en/of GBS-ziekte kunt u zich richten tot:

*Stichting Ouders van Groep-B-Streptokokken-patiënten (OGBS)*  
Trekweg 58

7322 HS Apeldoorn  
e-mail: [info@ogbs.nl](mailto:info@ogbs.nl)  
[www.ogbs.nl](http://www.ogbs.nl)