

Baarmoederfoto

Hystero-salpingogram

U krijgt binnenkort een baarmoederfoto (hystero-salpingografie/ HSG). De baarmoederfoto wordt gemaakt ter beoordeling van de baarmoederhals en baarmoeder-holte en de doorgankelijkheid van de eileiders.

Tevens kan worden gekeken of er aanwijzingen zijn voor de aanwezigheid van verklevingen in de onderbuik. Ook kan het doorspuiten van de eileiders een zwangerschapsbevorderend effect hebben.

Het onderzoek

Het onderzoek vindt plaats op de afdeling radiologie, door de gynaecoloog of arts-assistent samen met de radioloog. Net als bij het gewone gynaecologisch onderzoek wordt met een speculum (eendenbek) de baarmoedermond onderzocht.

Met twee hulpinstrumenten wordt de baarmoedermond vastgezet aan het spoelsysteem waarmee de contrastvloeistof in de baarmoeder wordt gebracht. De eileiders kunnen zichtbaar worden door middel van röntgenstraling. Tegelijkertijd worden er enkele röntgenfoto's gemaakt. Soms is het nodig om na 30-60 minuten nog een foto van de buik te maken: dit gebeurt uitwendig, zonder extra instrumenten of contrastvloeistof. Na het onderzoek kan wat bloed en slijm uit de schede lopen: dit kan enkele uren tot soms een paar dagen duren.

In de praktijk

Maak tijdens uw menstruatie een afspraak voor de baarmoederfoto via telefoonnummer (0318) 43 51 55. Het maken van de foto wordt gepland in de eerste twee weken na het eind van de menstruatie*. Het onderzoek vindt 's middags plaats. Voorkom dat u zwanger wordt in de cyclus waarin de baarmoederfoto wordt gemaakt. Tevens ten behoeve van het voorkomen van infecties wordt geadviseerd om vanaf de menstruatie tot ongeveer twee dagen na het maken van de foto bij geslachtsgemeenschap een condoom te gebruiken.

Het kan nuttig zijn ongeveer 2 uur voor het maken van de foto een pijnstillertje te nemen: bijvoorbeeld paracetamol, naproxen of ibuprofen. Deze middelen kunt u zonder recept kopen bij de drogist of apotheek (lees vooraf de bijsluiter). Soms krijgt u een antibioticumkuur voorgeschreven.

Op de dag van de foto wordt u geadviseerd iemand mee te nemen. Het onderzoek duurt ongeveer 15 minuten. Na het onderzoek kunt u nog wat buikpijn hebben. Ook kunt u nog duizelig zijn.

Na het onderzoek

Meestal kunt u de dag na het onderzoek uw gebruikelijke werkzaamheden verrichten. Heel zelden komt het voor dat na de baarmoederfoto koorts

ontstaat. Meestal is dit het gevolg van een soort overgevoeligheid voor de ingespoten vloeistof, zelden is er sprake van een ontsteking. Toch adviseren wij u om contact op te nemen als uw temperatuur thuis hoger wordt dan 38 graden. Of indien u hevige onderbuikspijn heeft. Meestal wordt een afspraak gemaakt voor een polikliniekbezoek 2 tot 3 weken na het onderzoek.

Vragen

Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft over het onderzoek, aarzel dan niet en neem contact op met de polikliniek gynaecologie.

Polikliniek gynaecologie is maandag tot en met vrijdag van 09.00 - 17.00 uur telefonisch bereikbaar, tel. (0318) 43 51 50.

** het kan gebeuren dat om organisatorische redenen de foto niet direct dezelfde cyclus kan worden gepland. Neemt u dan contact op aan het begin van de volgende menstruatie.*