



Prednison

Prednison kan worden toegepast bij veel aandoeningen waarbij ontstekingsverschijnselen een rol spelen. Daarnaast wordt het vaak in combinatie met andere geneesmiddelen toegepast bij het voorkomen van afstotingsreacties na orgaantransplantaties.

Indicatie

Ontstekingsziekten, zoals nefrotisch syndroom of COPD. Ter voorkoming van een afstotingsreactie na orgaantransplantatie.

Voorschrift

Prednison en prednisolon.

Innameadvies

Tablet en capsule bij voorkeur innemen vóór of tijdens de maaltijd met water. Bij maagklachten tijdens of vlak na het eten. Sommige tabletten hebben een vertraagde afgifte (aangeduid als MGA). In dat geval moet u ze heel doorslikken met voldoende vloeistof bij of na het avondeten of voor het slapen gaan. Als er meer dan 2–3 uur zijn verstreken sinds de avondmaaltijd, neem dan het tablet in met een lichte maaltijd.

Bijwerkingen

Bijwerkingen treden met name op bij langdurig gebruik van hoge doseringen.

- Soms toename van de eetlust, dikker worden van buik en gezicht.
- Zelden maagdarmklachten (maagpijn, misselijkheid, zuurbranden, opgezette buik, diarree of verstopping), hoofdpijn en duizeligheid, spierklachten. toegenomen vatbaarheid voor infecties, botontkalking, vasthouden van vocht en zout, ontstaan van diabetes, vertraagde wondgenezing, dunne broze huid en meer blauwe plekke, puistjes (acne), nachtzweeten. Tijdelijk verandering in gevoel en stemming.



Let op



- Omdat prednison het maagslijmvlies kan beschadigen, wordt vaak gelijktijdig een maagbeschermer voorgeschreven.
- Langdurig gebruik van hoge doseringen prednison veroorzaakt botontkalking. Om die gevolgen te beperken krijgt u ook extra calcium en vitamine D.
- Stop nooit zonder overleg met de nefroloog met het slikken van prednison/prednisolon. Gebruik moet langzaam worden afgebouwd.