

Speekselklieronderzoek

Sialendoscopie

In overleg met uw arts is besloten dat u binnenkort een kijkoperatie van de speekselklier (sialendoscopie) ondergaat. Een behandeling is nodig bij een (terugkerende) ontsteking van de speekselklier of als de klier pijnlijk gezwollen is. In de folder krijgt u informatie over deze ingreep.

Speekselklierklachten

Speekselklierklachten treden vooral op bij de maaltijd. Er ontstaat een zwelling doordat de speekselklierafvoergang verstopt is door een speekselsteen, slijmprop of door een vernauwing van de afvoerbuizen. Het speeksel dat tijdens de maaltijd geproduceerd wordt, komt dan niet in de mond maar hoopt zich op in de speekselklier gangen. De zwelling is vaak pijnlijk. Na de maaltijd verdwijnen de pijn en zwelling weer langzaam, omdat speeksel in de loop van de tijd langs de verstopping lekt.



Zwelling van de rechter oorspeekselklier (maaltijdsyndroom) één van de afvoerbuizen. Het speeksel dat tijdens de maaltijd geproduceerd

Kijkoperatie speekselklier

Met een kijkoperatie van de speekselklieren (sialendoscopie) is het mogelijk om de grote speekselklieren te inspecteren en verstoppingen, vernauwingen en speekselstenen te verwijderen.

De opname

Wilt u zich twee uur voor de operatie bij de receptie in de centrale hal melden. Hier wordt u naar de juiste afdeling verwezen. De verpleegkundige informeert u over het verloop van de dag en bereidt u voor op de operatie.

De ingreep

Bij een sialendoscopie rekt de chirurg de uitvoergang van de speekselklier iets op. Hierdoor brengt hij een ultra dunne buis (scoop) in de uitvoergang van de speekselklier.

Via deze scoop kan de chirurg:

- Vernauwingen in de uitvoergang in beeld brengen en oprekken.
- Speekselproppen verwijderen.
- Speekselstenen met een diameter van ongeveer 5 tot 6 millimeter met een korfje uit de speekselklierafvoergang verwijderen.
- Grote delen van de speekselklieren inspecteren.

De behandeltime is ongeveer 60 minuten.

Als de speekselsteen te groot is om met sialendoscopie te verwijderen, volgt aansluitend een gecombineerde ingreep om de steen of de vernauwing te verwijderen.

Na de ingreep

Na de operatie verblijft u ongeveer 60 minuten op de uitslaapkamer (Recovery). Daarna gaat u terug naar de verpleegafdeling.

De verpleegkundige neemt contact op met de door u opgegeven contactpersoon om te melden dat u weer terug bent op uw kamer.

Dan mag u weer drinken en eten. De verpleegkundige bekijkt hoe het gaat met de pijn en uw algehele situatie. Afhankelijk van uw herstel bepaalt de verpleegkundige, in overleg met u, het tijdstip van ontslag.

U krijgt bij ontslag een controle afspraak mee voor één à twee weken na de behandeling.

Complicaties

Het risico op complicaties bij deze ingreep is laag. Het zenuw- en bloedingsrisico bespreekt de chirurg voor de ingreep met u.

Contact

Heeft u na het lezen van de folder nog vragen? Neem gerust contact met ons op.

Neem ook contact met ons op als na de ingreep één van onderstaande klachten ontstaat:

- (na)bloeding die niet stopt
- er een forse zwelling ontstaat in de mond
- koorts (meer dan 38,5 graden)
- toename van de pijnklachten

Tijdens kantooruren kunt u contact opnemen met de polikliniek Mond, kaak en aangezichtschirurgie, (0318) 43 43 45.

Buiten kantoor tijden en in het weekend kunt u bellen met de medewerkers van de spoedeisende hulp, (0318) 43 58 05.

Afdeling mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie:

- M.O. de Lange
- dr. P.J. van Strijen

Voor meer informatie zie ook www.zgv.nl/mka