

Proef facetdenervatie

Indien u klachten heeft vanuit de steungewrichtjes van de wervelkolom, kunt u in bepaalde gevallen in aanmerking komen voor een RF facetdenervatie. Voorafgaand vindt er eerst een proefbehandeling plaats. Dit is een behandeling waarbij de pijngeleiding vanuit de steungewrichtjes, die gelegen zijn aan de achterkant van de wervelkolom, tijdelijk onderbroken wordt door middel van een verdovingsvloeistof.

Algemene informatie

U mag voor deze behandeling gewoon alles eten en drinken, tenzij de arts anders met u afgesproken heeft. Dit is een poliklinische behandeling. U hoeft hiervoor niet opgenomen te worden, tenzij de arts het raadzaam vindt en dit met u afspreekt. De behandeling vindt plaats ter hoogte van de nek, de borstkas of lage rug. De behandeling duurt ongeveer 15 tot 20 minuten.

Behandeling

U neemt in de gewenste positie plaats op de behandeltafel. Indien u in buikligging plaatsneemt, heeft u een kussen onder uw buik. Onder röntgendoorlichting worden 4 naalden geplaatst bij de zenuwtakjes van de betreffende steungewrichten. Vervolgens volgt er door deze naalden een injectie met een verdovingsvloeistof. De arts vraagt u of u wilt opletten of u tijdelijk een gunstig effect op uw klachten bemerkt in de periode tussen 30 en 90 minuten na de injectie en evalueert uw uitkomst tijdens een controlegesprek.

Complicaties

Complicaties zijn zeldzaam en de arts voert de behandeling altijd zorgvuldig uit. Toch bestaat er een geringe kans op complicaties:

- een lokale infectie
- een lokale bloeding
- een allergische reactie

Bijwerkingen

- Er kan een tijdelijke gevoelsvermindering optreden in de huid in de buurt van de behandelde steungewrichten.
- U kunt last krijgen van napijn na de behandeling. Deze napijn kan enkele dagen aanhouden, maar verdwijnt altijd weer. Indien u hier veel last van heeft, kunt u hiervoor een pijnstiller innemen, bijvoorbeeld Paracetamol.

Attentie

- Informeer uw arts over een eventuele allergie voor jodium, contrastmiddel of medicijnen.
- Informeer uw arts over een eventuele zwangerschap in verband met de röntgenstraling die tijdens de behandeling gebruikt wordt.
- Indien u antistollingsmiddelen gebruikt (Acenocoumarol/ Sintrom of Fenprocoumon/Marcoumar), waarvoor controle bij de trombosedienst noodzakelijk is, bespreek dit dan met uw arts. Over het algemeen mag u deze door blijven gebruiken en krijgt u een recept voor een vitamine k tablet/drank. Die neemt u 36 uur voor de behandeling in. Ook is het belangrijk dat op de dag van de behandeling uw bloed op het laboratorium gecontroleerd wordt.
- Gebruikt u antistollingsmiddelen waarvoor geen controle nodig is bij de trombosedienst (Ascal, Acetylsalicylzuur of Plavix), bespreek dan met uw arts of u hiermee moet stoppen of kunt doorgaan.
- Sommige blokkades ter hoogte van de borstkas of ribben hebben een klein risico op een klaplong; indien nodig zal de anesthesioloog u hierover nader informeren.
- Na de behandeling mag u dezelfde dag niet zelfstandig aan het verkeer deelnemen omdat u last kunt krijgen van een kortdurende krachtsvermindering van de benen of armen.

Indien u op de dag van de behandeling koorts heeft, verzoeken wij u om telefonisch contact op te nemen met uw behandelend arts.

Vragen

Indien u vragen heeft kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met het Pijncentrum Gelderse Vallei, (0318) 43 58 70.