

ILR verwijderen

In samenspraak met u is besloten dat uw behandelend specialist bij u de ILR (implantable loop recorder) gaat verwijderen. In deze folder leest u hoe u zich hierop thuis voorbereidt en vindt u informatie over het verloop van de ingreep.

Vorbereiding

U mag de dag van de opname normaal ontbijten. Wij raden u aan om geen waardevolle spullen mee te nemen naar het ziekenhuis.

Medicijnen

Wanneer u onder controle bent van de trombosedienst, is het de bedoeling dat u 36 tot 48 uur voor de ingreep een vitamine K tablet inneemt. Dit recept krijgt u van de cardioloog tijdens uw polikliniekbezoek. Ascal mag u blijven gebruiken. Gebruikt u een andere antistollingsmedicatie? Dan hoort u van uw cardioloog of/wanneer u deze dient te stoppen.

Wilt u uw eventuele plasmedicatie na het onderzoek innemen?

Dag van de opname

Op de dag van de opname kunt u zich melden bij de opnamebalie in de centrale hal. Zij brengen u naar de afdeling. U wordt opgenomen op de afdeling cardiologie of de dagbehandeling. De ingreep zelf vindt op de hartkatheterisatiekamer plaats. Voorafgaand aan het verwijderen van de ILR worden de volgende voorbereidingen getroffen:

- indien nodig aanvullend bloedonderzoek
- meten van de bloeddruk, pols en temperatuur
- u krijgt een infuus met antibiotica
- het maken van een ECG

De verpleegkundige geeft u verdere informatie over de opname en het verwijderen van de ILR. Indien nodig scheert de verpleegkundige uw borstkast. Als u het operatiejasje aankrijgt, is het belangrijk dat u ook uw sieraden af doet. U krijgt op de afdeling rustgevendende en pijnstillende medicatie. Daarna brengt de verpleegkundige u naar de hartkatheterisatiekamer.

Het verwijderen van de ILR

De ingreep vindt plaats onder plaatselijke verdoving en duurt ongeveer 30 minuten. De hartstimulatiespecialist zal nog eenmaal de ILR uitlezen op bijzonderheden voordat hij wordt verwijderd. De cardioloog verwijdert de ILR en wordt daarbij geassisteerd door een steriele assistente en de hartstimulatiespecialist. De wond wordt gesloten met 1 tot 2 hechtingen of hechtpleisters.

Ontslag

Na het verwijderen van de ILR mag u direct bewegen. Als u koortsvrij bent en de wond is geïnspecteerd, mag u naar huis. Dit is vaak dezelfde dag. U mag bij pijnklachten zo nodig paracetamol gebruiken. De wond moet de eerste dagen goed in de gaten worden gehouden. De wond moet droog blijven totdat de hechtingen zijn verwijderd. Afhankelijk van het soort hechtingen dat is gebruikt, kan het zijn dat u deze na 7 dagen moet laten verwijderen door de huisarts. De verpleegkundige vertelt u dit. U mag uw medicatie weer innemen zoals u gewend bent.

De meest voorkomende risico's bij deze ingreep zijn een infectie en/of een bloeding van de wond. Heeft u hier nog vragen over stel ze aan uw cardioloog. U dient tijdens kantoor tijden direct contact op te nemen met de polikliniek cardiologie (0318 – 43 43 45) in geval van:

- koorts
- ontstaan van een blauwe plek bij de wond
- rood en dik worden van de wond

Buiten kantoor tijden kunt u contact opnemen met de EHH (Eerste Hart Hulp) via (0318)43 41 51.

Controle

U hoeft niet meer bij de cardioloog voor controle te komen tenzij dit anders met u is besproken. Ook hoeft u niet meer voor controle bij de hartstimulatiespecialist te komen.

Vragen

Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, neem dan gerust contact op met de afdeling hartfunctie. Zij zijn van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur bereikbaar via (0318) 43 57 92.