

Sedatie en pijnstilling op de spoedeisende hulp

Deze folder geeft u informatie over de sedatie en pijnstilling op de spoedeisende hulp van Ziekenhuis Gelderse Vallei. Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u deze stellen aan de medewerkers van de spoedeisende hulp.

Sedatie

Voor bepaalde ingrepen kan de arts besluiten u niet alleen pijnstilling te geven, maar ook een sederend medicijn. Door dit medicijn valt u in een lichte slaap waardoor u de ingreep comfortabeler ondergaat.

Toediening

De verpleegkundige zal bij u een infuus prikken zodat het medicijn intraveneus, dat wil zeggen via de bloedbaan, kan worden toegediend. Om u tijdens de ingreep in te gaten te kunnen houden wordt u aangesloten op een monitor die uw bloeddruk, hartslag en zuurstofgehalte meet.

Na het toedienen van het medicijn valt u vrij snel in slaap en volgt de ingreep. Kort hierna wordt u weer wakker, maar u kunt zich nog wel iets slaperig voelen. Vaak herinnert u zich weinig van de ingreep zelf door het toegediende medicijn.

Bij elke procedure is altijd minimaal één arts en één verpleegkundige aanwezig.

Naar huis

Na de behandeling mag u naar huis als:

- u goed wakker bent
- uw hartslag en bloeddruk goed zijn
- u kunt drinken en niet misselijk bent
- u rechtop kunt zitten en niet duizelig bent

Indien nodig krijgt u pijnstillers mee naar huis. Het advies is om tot 12 uur na een dergelijke ingreep geen voertuigen of machines te besturen. Neem geen belangrijke beslissingen en onderteken geen belangrijke documenten.

Arts waarschuwen

Als u last krijgt van misselijkheid en/of braken of andere klachten die u niet vertrouwt, belt u dan naar de spoedeisende hulp.

Vragen

Bij vragen of klachten die binnen 24 uur optreden belt u met de afdeling spoedeisende hulp, (0318) 43 58 05.

Na de eerste 24 uur belt u uw eigen huisarts of de polikliniek.

Bron: Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen,
patiëntenfolder, www.nvsha.nl