

# **Weghalen van vocht achter de longen**

## Pleurapunctie

**Binnenkort wordt er vocht achter uw longen weggehaald, dit heet een pleurapunctie. In deze folder kunt u hier meer over lezen.**

### **Vocht achter de longen (pleuravocht)**

Om de longen heen bevinden zich twee vliezen. Tussen deze twee vliezen (de pleuraholte) kan zich vocht ophopen.

Door de vochtophoping komen de longen in verdrukking. Dit kan voor verschillende klachten zorgen, bijvoorbeeld benauwdheid. Soms zit er maar heel weinig vocht, waardoor er geen directe klachten zijn. Maar de longarts wil dan wel graag een diagnose hebben. Met een röntgenfoto en met een echo van de borstkas wordt vastgesteld of er daadwerkelijk vocht achter de longen zit.

### **Vorbereiding**

U hoeft voor een pleurapunctie niet nuchter te zijn, u mag van te voren eten en drinken. Het is belangrijk dat u vooraf het gebruik van bloedverdunnende medicijnen aan de arts bekend maakt. Uw arts geeft aan of u de bloedverdunnende medicijnen (tijdelijk) moet stoppen. De arts vertelt u vooraf of u extra medicijnen moet gebruiken.

### **Het onderzoek**

Datum: .....dag ...../.....20.....

Tijd onderzoek:..... uur, Ede.

- Melden bij het scopiecentrum ..... uur.  
U vindt deze afdeling op de eerste etage, B - vleugel, bestemming 104.
- Melden bij de opname .....uur, in de centrale hal.  
Men brengt u dan naar de betreffende afdeling.

## **Verloop pleurapunctie**

De pleurapunctie wordt uitgevoerd in het scopiecentrum. Hierbij zit of ligt u op de onderzoekstafel.

De pleurapunctie gebeurt via uw rug, tussen twee ribben door. Er kan gekozen worden voor een pleurapunctie met naald en spuit of voor een drain (slangetje).

Als de pleurapunctie uitgevoerd wordt met een naald en spuit, brengt de arts de naald in tussen twee ribben. Bij het gebruik van de naald en spuit wordt de huid niet vooraf verdoofd. Na het inbrengen van de naald wordt het vocht via de naald in de spuit gezogen en wordt op deze manier het vocht verwijderd.

Bij gebruik van een drain (slangetje) wordt de huid vooraf verdoofd. De arts brengt een naald met een drain in, hiermee haalt de arts het vocht weg. Als er veel vocht weggehaald moet worden, blijft de drain een tijdje zitten. Bijna altijd wordt er vocht opgestuurd voor onderzoek. De uitslag van het opgestuurde vocht krijgt u van uw behandeld arts.

De pleurapunctie duurt ongeveer 15 minuten. Als de naald of de drain wordt verwijderd krijgt u een pleister op het wondje geplakt. De pleister mag na twee dagen weer worden verwijderd.

## **Na de ingreep**

Het is verstandig om een half uur na de ingreep rustig aan te doen. Vaak is de benauwdheid al snel verminderd. Wel kan het voorkomen dat de schouder en zij wat pijnlijk zijn na de ingreep. U kan ook een kriebelhoest krijgen. Dit komt omdat de long weer meer ruimte krijgt doordat het vocht is weggehaald. Soms laat de arts een röntgenfoto van de borstkas maken, dit om te zien wat het effect van de ingreep is. Ook is zo te zien of er eventueel sprake is van een klaplong.

## **Complicaties**

Complicaties komen bij een pleurapunctie gelukkig bijna niet voor. Soms ontstaat plotseling een lage bloeddruk en een langzame hartslag (flauwvallen). Dit is een reactie van het lichaam op de prik en trekt snel weer weg.

Zéér zelden ontstaat er een klaplong. De klaplong is pas merkbaar nadat het onderzoek is afgelopen.

## **Vragen**

Als u vragen heeft kunt u terecht bij uw longarts. Ook kunt u contact opnemen met het scopiecentrum, (0318) 43 41 70.