

Combinatie-afspraken vermoeden COPD

U bent door uw huisarts verwezen naar het ziekenhuis voor een combinatieafpraak vermoeden COPD. Dit houdt in dat u op één en dezelfde dag verschillende onderzoeken ondergaat. Het betreft een longfoto en longfunctieonderzoek. Daarna gaat u naar de longarts/physician assistant die de uitslagen met u bespreekt.

Vorbereiding

U mag gewoon eten en drinken voor de onderzoeken. Voor het longfunctieonderzoek is het belangrijk dat u rustig en ontspannen aan het onderzoek begint, komt u daarom op tijd. Het goed slagen van de test is mede afhankelijk van medicijngebruik. Hieronder is aangekruist wat voor u van toepassing is:

- Longmedicatie doorgebruiken
- 24 uur tevoren geen inhalatiemedicatie gebruiken

De onderzoeken

Longfoto

Het onderzoek duurt 5 á 10 minuten. Dit gebeurt op de afdeling radiologie. De afdeling radiologie vindt u in de A vleugel, 1ste etage, bestemming 41.

Longfunctieonderzoek

Dit gebeurt op de afdeling longfunctie. Bij iedere test van de longfunctie ademt u via een mondstuk. Dit mondstuk is verbonden met het longfunctieapparaat. Een klemmetje op uw neus voorkomt dat u door uw neus ademt. De afdeling longfunctie vindt u in de A vleugel op de begane grond, bestemming 37.

Spirometrie

Het onderzoek duurt een kwartier. Spirometrie bepaalt de kwaliteit van de luchtwegen en hoeveelheid lucht maximaal in- en uit kan worden geademd. Als de arts dit aangegeven heeft, wordt de test herhaald na het toedienen van een medicijn wat de luchtweg kan verwijden. De duur van het onderzoek wordt dan met een half uur verlengd.

Bodybox

Het onderzoek duurt een half uur. Dit onderzoek meet de weerstand van de luchtwegen, ofwel hoeveel moeite het u kost om adem te halen. Ook wordt de longinhoud gemeten. Deze test vindt plaats in een gesloten ruimte, die lijkt op een telefooncel. Indien uw arts dit aangegeven heeft, wordt de test herhaald na het toedienen van een medicijn dat de luchtweg verwijdt. De duur van het onderzoek wordt dan met een half uur verlengd.

Diffusie-test

Het onderzoek duurt een kwartier. Voordat u deze test ondergaat krijgt u een vingerprik waarmee het Hb wordt bepaald. De diffusietest meet hoe snel uw longen de ingeademde zuurstof doorgeven aan het bloed. Nadat u volledig hebt uitgeblazen moet u diep inademen en deze adem tien seconden vasthouden. Vervolgens blaast u weer uit in het apparaat.

Bio-impedantiemeting

Het onderzoek duurt een kwartier. Dit is een onderzoek om vast te stellen of uw lichaam voldoende spierweefsel bevat. Ook wordt bepaald of uw lichaamsgewicht normaal is. Belangrijk bij dit onderzoek is dat uw blaas leeg is. U krijgt vooraf de gelegenheid om naar het toilet te gaan. U neemt plaats op een bed en krijgt twee pakkers op uw voet en op uw hand. De meting wordt verricht met een zeer zwak, niet voelbaar elektrisch stroomstootje. Na afloop van de longfunctietesten krijgt u twee vragenlijsten. Wilt u deze vragenlijsten direct invullen en meenemen naar de longarts?

Uitslag

Aansluitend aan deze onderzoeken krijgt u de uitslagen van de longarts/physician assistant te horen.

Vragen

Als u nog vragen heeft over de onderzoeken, dan kunt u deze stellen aan uw huisarts. Ook kunt u contact opnemen met de afdeling longfunctie, (0318) 43 53 10.